

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **12** हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **30** प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains **12** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **30** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

## रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)

### CHEMISTRY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70



### सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) प्रश्न-संख्या 1 से 8 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है ।
- (iii) प्रश्न-संख्या 9 से 18 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं ।
- (iv) प्रश्न-संख्या 19 से 27 तक भी लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं ।
- (v) प्रश्न-संख्या 28 से 30 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक हैं ।
- (vi) आवश्यकतानुसार लॉग टेबलों का प्रयोग करें । कैल्कुलेटर्स के उपयोग की अनुमति नहीं है ।

### General Instructions :

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Questions number 1 to 8 are very short-answer questions and carry 1 mark each.
- (iii) Questions number 9 to 18 are short-answer questions and carry 2 marks each.
- (iv) Questions number 19 to 27 are also short-answer questions and carry 3 marks each.
- (v) Questions number 28 to 30 are long-answer questions and carry 5 marks each.
- (vi) Use Log Tables, if necessary. Use of calculators is **not** allowed.

1. क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक क्यों होते हैं ? 1

Why are crystalline solids anisotropic ?

2. इमल्शन क्या होते हैं ? एक ऐसे इमल्शन का नाम दीजिए जिसमें जल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है । 1

What are emulsions ? Name an emulsion in which water is a dispersed phase.




3. फेन प्लवन प्रक्रम में प्रयुक्त संग्राही क्या होते हैं ? एक पदार्थ का नाम दीजिए जो इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है । 1

What are the collectors used in froth floatation process ? Name a substance that can be used as such.


4.  $\text{Cl}_2$  की अपेक्षा  $\text{F}_2$  प्रबलतर उपचायक क्यों होता है ? 1

Why is  $\text{F}_2$  a stronger oxidising agent than  $\text{Cl}_2$  ?

5. उस ऐल्कोहॉल का नाम लिखिए जिसका निम्न एस्टर को बनाने में उपयोग किया जाता है : 1



Name the alcohol that is used to make the following ester :



6. प्रोपेन-2-ओन और पेंटेन-3-ओन के बीच अंतर करने के लिए एक जाँच लिखिए । 1

Give a test to distinguish between propan-2-one and pentan-3-one.

7. 'होमोपॉलीमर', 'कोपॉलीमर' से कैसे भिन्न होता है ? 1

How does a homopolymer differ from a copolymer ?

8. 'पेप्टाइड लिंकेज' को परिभाषित कीजिए । 1

Define a 'Peptide linkage'.

9. स्टैंडर्ड ड्राई सेल के लिए नेन्स्ट समीकरण को लिखिए । इस समीकरण का प्रयोग करते हुए यह दर्शाइए कि उपयोग करने के साथ शुष्क सेल की वोल्टता को घटना चाहिए । 2

Set up Nernst equation for the standard dry cell. Using this equation show that the voltage of a dry cell has to decrease with use.



10. एक अभिक्रिया की दर पर तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है ? अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर इस प्रभाव को मात्रात्मक ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है ? 2

How does a change in temperature affect the rate of a reaction ? How can this effect on the rate constant of a reaction be represented quantitatively ?

11. निम्न प्रक्रमों में प्रत्येक के आधारमूल सिद्धान्त का वर्णन कीजिए : 2

- (i) NaCN विलयन के साथ सिल्वर अयस्क को निक्षालित करने से प्राप्त हुए विलयन से सिल्वर की पुनःप्राप्ति  
(ii) एक अशुद्ध धातु का विद्युत्-अपघटनी परिष्करण

अथवा

- निम्न प्रक्रमों में प्रत्येक के पीछे जो कार्यकारी सिद्धान्त है उसका वर्णन कीजिए : 2

- (i) धातु का ज़ोन (मंडल) परिष्करण  
(ii) धातुओं की वाष्प प्रावस्था का परिष्करण

Describe the underlying principle of each of the following processes :

- (i) Recovery of silver from the solution obtained by leaching silver ore with a solution of NaCN  
(ii) Electrolytic refining of a crude metal

OR

Describe the principle involved in each of the following processes :

- (i) Zone refining of a metal  
(ii) Vapour phase refining of metals

12. निम्न रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए : 2

- (i)  $\text{SO}_2 + \text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$   
(ii)  $\text{F}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow$

Complete the following chemical equations :

- (i)  $\text{SO}_2 + \text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$   
(ii)  $\text{F}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow$



13. निम्नलिखित के कारण लिखिए : 2

- (i) कॉपर(I) आयन का जलीय विलयनों में होना नहीं जाना जाता है ।
- (ii)  $O_2$  और  $F_2$  दोनों ही संक्रमण धातुओं की उच्च उपचयन अवस्थाओं को स्थिरता देती हैं परन्तु उच्च उपचयन अवस्था को स्थिरता देने में ऑक्सीजन की क्षमता फ्लूओरीन से अधिक होती है ।

Assign reasons for the following :

- (i) Copper(I) ion is not known to exist in aqueous solutions.
- (ii) Both  $O_2$  and  $F_2$  stabilize high oxidation states of transition metals but the ability of oxygen to do so exceeds that of fluorine.

14. निम्न यौगिकों के आई. यू. पी. ए. सी. (IUPAC) नामों को लिखिए : 2

- (i)  $CH_2 = CHCH_2Br$
- (ii)  $(CCl_3)_3 CCl$


Write the IUPAC names of the following compounds :

- (i)  $CH_2 = CHCH_2Br$
- (ii)  $(CCl_3)_3 CCl$


15. उभयकारणी नाभिकस्नेही (ऐम्बिडेण्ट न्यूक्लियोफाइल्स) क्या होते हैं ? एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए । 2

What are ambident nucleophiles ? Explain with an example.


16. (i) निम्न यौगिकों को क्षारक सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :




(ii) निम्न यौगिकों को  $pK_b$  मानों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



(i) Arrange the following compounds in an increasing order of basic strength :



(ii) Arrange the following compounds in a decreasing order of  $pK_b$  values :



17. यौगिकों के निम्न युग्मों के बीच अंतर करने के लिए एक-एक रासायनिक जाँच दीजिए : 2
- (i) एथिलऐमीन और ऐनिलीन
  - (ii) ऐनिलीन और बेन्ज़िलऐमीन

Give a chemical test to distinguish between each of the following pairs of compounds :

- (i) Ethylamine and Aniline
- (ii) Aniline and Benzylamine

18. निम्न बहुलकों को प्राप्त करने के लिए जो एकलक उपयोग में लाए जाते हैं उनके नाम और उनकी संरचनाएँ लिखिए : 2
- (i) बूना-S
  - (ii) नाइलॉन-6, 6

Write the names and structures of monomers used for getting the following polymers :

- (i) Buna-S
- (ii) Nylon-6, 6

19. 286.65 pm किनारे (सेल) के विस्तार के साथ आयरन का काय केन्द्रित घनीय यूनिट सेल है। आयरन का घनत्व  $7.874 \text{ g cm}^{-3}$  है। इस सूचना का उपयोग करते हुए ऐवोगैट्रो संख्या का परिकलन कीजिए। (Fe का ग्राम परमाण्विक द्रव्यमान =  $55.84 \text{ g mol}^{-1}$ ) 3

Iron has a body centred cubic unit cell with a cell dimension of 286.65 pm. The density of iron is  $7.874 \text{ g cm}^{-3}$ . Use this information to calculate Avogadro's number (Gram atomic mass of Fe =  $55.84 \text{ g mol}^{-1}$ ).

20.  $25^\circ \text{C}$  पर 0.01 M NaCl विलयन का प्रतिरोध  $200 \Omega$  है। प्रयुक्त चालकता-सेल का सेल स्थिरांक एक है। विलयन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 3

The resistance of 0.01 M NaCl solution at  $25^\circ \text{C}$  is  $200 \Omega$ . The cell constant of the conductivity cell used is unity. Calculate the molar conductivity of the solution.



21. दो भिन्न-भिन्न तापमानों पर विघटन अभिक्रिया के लिए  $k$  के मान नीचे दिए गए हैं :

$$k_1 = 2.15 \times 10^{-8} \text{ L/(mol.s), 650 K पर}$$

$$k_2 = 2.39 \times 10^{-7} \text{ L/(mol.s), 700 K पर}$$

अभिक्रिया के लिए  $E_a$  का मान परिकलित कीजिए ।

$$(\text{Log } 11.11 = 1.046) \quad (R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

3

For a decomposition reaction, the values of  $k$  at two different temperatures are given below :

$$k_1 = 2.15 \times 10^{-8} \text{ L/(mol.s) at 650 K}$$

$$k_2 = 2.39 \times 10^{-7} \text{ L/(mol.s) at 700 K}$$

Calculate the value of  $E_a$  for the reaction.

$$(\text{Log } 11.11 = 1.046) \quad (R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

22. उपयुक्त उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए कि अधिशोषण के दो प्रकार के प्रक्रम (भौतिक व रासायनिक अधिशोषण) किस प्रकार तापमान, अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सक्रियण ऊर्जा के मान से प्रभावित होते हैं ?

3

**अथवा**

स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए कि अधिशोषण की परिघटना निम्न में कैसे अनुप्रयोग पाती है :

3

- (i) एक बर्तन में निर्वात पैदा करने में
- (ii) विषमांगी उत्प्रेरण में
- (iii) धातुकर्म में फेन प्लवन प्रक्रम में

Giving appropriate examples, explain how the two types of processes of adsorption (physisorption and chemisorption) are influenced by the prevailing temperature, the surface area of adsorbent and the activation energy of the process ?

**OR**

Explain clearly how the phenomenon of adsorption finds application in


- (i) production of vacuum in a vessel
- (ii) heterogeneous catalysis
- (iii) froth floatation process in metallurgy



23. कारण देते हुए निम्न की व्याख्या कीजिए : 3
- संक्रमण धातुएँ दीर्घ परास में उपचयन अवस्थाएँ प्रदर्शित करती हैं ।
  - कोबाल्ट(II) जलीय घोलों में बहुत स्थाई है परन्तु प्रबल लिगेण्डों की उपस्थिति में सरलता से उपचयित हो जाता है ।
  - लैन्थेनोयडों की अपेक्षा ऐक्टिनोयडें बृहत्तर परास में उपचयन अवस्थाएँ प्रदर्शित करते हैं ।


Give reasons for the following :

- Transition metals exhibit a wide range of oxidation states.
  - Cobalt(II) is very stable in aqueous solutions but gets easily oxidised in the presence of strong ligands.
  - Actinoids exhibit a greater range of oxidation states than lanthanoids.
24. निम्न कॉम्प्लेक्स अवस्थाओं में प्रत्येक का IUPAC नाम लिखिए और प्रत्येक की संरचना आरेखित कीजिए : 3



(परमाणु क्रमांक Cr = 25, Co = 27, Pt = 78)

Write the IUPAC name and draw the structure of each of the following complex entities :



(At. nos. Cr = 25, Co = 27, Pt = 78)

25. प्रत्येक के लिए एक-एक उदाहरण के साथ निम्न की व्याख्या कीजिए :

- कोल्बे की अभिक्रिया
- रीमर-टीमान अभिक्रिया
- विलियमसन ईथर संश्लेषण

Explain the following with an example for each :

- Kolbe's reaction
- Reimer-Tiemann reaction
- Williamson ether synthesis





26. आवश्यक और अनावश्यक ऐमीनो अम्ल क्या होते हैं ? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए । 3

What are essential and non-essential amino acids ? Give two examples of each.

27. निम्न पदों का क्या तात्पर्य होता है ? प्रत्येक को एक-एक उदाहरण सहित समझाइए ।

(i) औषधीय रसायन में उपयोगानुसार लक्ष्य अणु

(ii) खाद्य परिरक्षक

(iii) अनायनिक (नॉन-आयनिक) अपमार्जक 3

What is meant by the following terms ? Explain with an example for each.

(i) Target molecules as used in medicinal chemistry

(ii) Food preservatives

(iii) Non-ionic detergents

28. (a) वैण्ट हॉफ कारक क्या होता है ? इसके मान किस प्रकार के होते हैं यदि विलयन के बनने में विलेय के अणु

(i) विघटित होते हैं ?

(ii) संगठित होते हैं ?

(b)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  और  $\text{NaHCO}_3$  के 1 g मिश्रण में दोनों पदार्थों की समान मोलर मात्राएँ मिली हुई हैं । इस मिश्रण के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने के लिए 0.1 M HCl विलयन के कितने mL की आवश्यकता होगी ? 2, 3

(मोलर द्रव्यमान :  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106 \text{ g}$ ,  $\text{NaHCO}_3 = 84 \text{ g}$ )

अथवा

(a) परिभाषा लिखिए :

(i) मोल प्रभांश

(ii) मोललता

(iii) राउल्ट का नियम

(b) पूर्ण रूप से वियोजित मानते हुए, उस विलयन का प्रत्याशित हिमांक परिकलित कीजिए जो 0.100 kg जल में ग्लॉबर लवण (सज्जी),  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$  के 6.00 g को घुलाने से बनाया गया हो ।

(जल के लिए  $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ , परमाणु द्रव्यमान : Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1) 3, 2



- (a) What is van't Hoff factor ? What types of values can it have if in forming the solution the solute molecules undergo
- Dissociation ?
  - Association ?
- (b) How many mL of a 0.1 M HCl solution are required to react completely with 1 g of a mixture of  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  and  $\text{NaHCO}_3$  containing equimolar amounts of both ?

(Molar mass :  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106 \text{ g}$ ,  $\text{NaHCO}_3 = 84 \text{ g}$ )

**OR**

- (a) Define
- Mole fraction
  - Molality
  - Raoult's law
- (b) Assuming complete dissociation, calculate the expected freezing point of a solution prepared by dissolving 6.00 g of Glauber's salt,  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$  in 0.100 kg of water.  
( $K_f$  for water =  $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ , Atomic masses : Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1)

- 29.** (a) उस उत्कृष्ट गैस स्पीशीज का सूत्र लिखिए और उसकी संरचना का वर्णन कीजिए जो निम्न के साथ समसंरचनात्मक हो :
- $\text{IBr}_2^-$
  - $\text{BrO}_3^-$
- (b) निम्न के कारण लिखिए :
- $\text{SF}_6$  गतिकतः निष्क्रिय होता है ।
  - $\text{NF}_3$  एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है जबकि  $\text{NCl}_3$  ऐसा नहीं है ।
  - $\text{HF}$  की अपेक्षा  $\text{HCl}$  प्रबलतर अम्ल है यद्यपि फ्लुओरीन क्लोरीन की अपेक्षा अधिक विद्युत्-ऋणात्मक है ।

2, 3

**अथवा**

- (a) बड़े पैमाने पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है ? उस प्रक्रम का नाम दीजिए और इस प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए ।
- (b) निम्न के लिए कारण लिखिए :
- $\text{H}_2\text{O}$  की अपेक्षा  $\text{H}_2\text{S}$  अधिक अम्लीय है ।
  - $\text{PH}_3$  की अपेक्षा  $\text{NH}_3$  अधिक क्षारीय है ।
  - ऑक्सीजन की अपेक्षा सल्फर में शृंखलन की प्रवृत्ति अधिक है ।

2, 3



- (a) Write the formula and describe the structure of a noble gas species which is isostructural with
- $\text{IBr}_2^-$
  - $\text{BrO}_3^-$
- (b) Assign reasons for the following :
- $\text{SF}_6$  is kinetically inert.
  - $\text{NF}_3$  is an exothermic compound whereas  $\text{NCl}_3$  is not.
  - $\text{HCl}$  is a stronger acid than  $\text{HF}$  though fluorine is more electronegative than chlorine.

**OR**

- (a) How is ammonia prepared on a large scale ? Name the process and mention the optimum conditions for the production of ammonia by this process.
- (b) Assign reasons for the following :
- $\text{H}_2\text{S}$  is more acidic than  $\text{H}_2\text{O}$ .
  - $\text{NH}_3$  is more basic than  $\text{PH}_3$ .
  - Sulphur has a greater tendency for catenation than oxygen.

**30.** (a) निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए :

- $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$
- $\text{Ph} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CHO}$

(b) निम्न रूपांतरणों का वर्णन आप दो चरणों से अधिक नहीं में कैसे करेंगे :

- एथेनॉल को 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटैनैल में
- बेन्ज़ोइक अम्ल को m-नाइट्रोबेन्ज़िल ऐल्कोहॉल में
- प्रोपेनोन को प्रोपीन में

2, 3

**अथवा**



- (a) निम्न यौगिकों की संरचनाएँ आरेखित कीजिए :
- 4-क्लोरोपेंटेन-2-ओन
  - p-नाइट्रोप्रोपिओफीनोन
- (b) यौगिकों के निम्न युग्मों में भिन्नता करने के लिए जाँचों को दीजिए :
- एथैनैल और प्रोपैनैल में
  - फीनॉल और बेन्ज़ोइक अम्ल में
  - बेन्ज़ैल्डिहाइड और ऐसीटोफीनोन में

2, 3

- (a) Write the IUPAC names of the following compounds :
- $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$
  - $\text{Ph} - \text{CH} = \text{CH} - \text{CHO}$
- (b) Describe the following conversions in not more than two steps :
- Ethanol to 3-Hydroxybutanal
  - Benzoic acid to m-Nitrobenzyl alcohol
  - Propanone to Propene

**OR**


- (a) Draw the structures of the following compounds :
- 4-Chloropentan-2-one
  - p-Nitropropionophenone
- (b) Give tests to distinguish between the following pairs of compounds :
- Ethanal and Propanal
  - Phenol and Benzoic acid
  - Benzaldehyde and Acetophenone



**CHEMISTRY MARKING SCHEME**  
**OUTSIDE DELHI -2014**  
**SET -56/1**

Qn	Answers	Marks
1	Because of differential arrangement of particles in different directions	1
2	Emulsion – Liquid-liquid colloidal system Eg : milk, vanishing cream (or any other)	½ ½
3	Collectors enhance the non-wettability of mineral particles Pine oil, fatty acids, xanthates (any one)	½ ½
4	Because of low bond dissociation enthalpy and high electron gain enthalpy with negative sign of fluorine	½+½
5	2-propanol / propan-2-ol	1
6	On heating with NaOH +I <sub>2</sub> , propan – 2-one forms yellow ppt of iodoform whereas pentan-3-one does not.	1
7	Homopolymer is formed by repeating the same monomer unit whereas copolymer is formed by repeating two different monomers.	1
8	The linkage between two amino acids i.e. – CO-NH – is known as peptide linkage.	1
9	<p>Anode: <math>Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}</math>            Cathode: <math>MnO_2 + NH_4^{+} + e^{-} \longrightarrow MnO(OH) + NH_3</math></p> Due to the presence of ions in the over all reaction, its voltage decreases with time.	½+½ 1
10	Rate of reaction increases with temperature. Rate of a reaction nearly doubles with 10 <sup>0</sup> rise in temperature / graphical representation.	1 1
11	a) Ag with dil NaCN forms a complex i.e. [Ag(CN) <sub>2</sub> ] <sup>-</sup> which dissolves and is subsequently reduced by Zn to give silver b) Electrolytic refining – in this method impure metal is made to act as an anode and the pure metal as cathode in a suitable electrolytic bath containing soluble salt of the same metal. Pure metal is deposited at cathode.	1 1





OR		
11	a) It is based on the principle that the impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the metal.	1
	b) In this, the metal is converted into its volatile compound which is then decomposed to give pure metal.	1
12	a) $5\text{SO}_2 + 2\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 5\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}^+$	1
	b) $2\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{F}^-(\text{aq}) + \text{O}_2$	1
13	a) Because it undergoes disproportionation reaction / $2\text{Cu}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{s}) + \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	1
	b) Because of the ability of oxygen to form multiple bonds	1
14	a) 3-bromoprop-1-ene / 3-bromopropene	1
	b) Tris-(trichloromethyl)chloromethane	1
15	An ambident nucleophile is that which possesses two nucleophilic centres For example $\text{CN}^-$ (it forms cyanides and isocyanides) (or any other correct example)	1 1
16	a) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_3)_2 < \text{CH}_3\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$	1
	b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 > \text{C}_6\text{H}_5\text{NHCH}_3 > \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 > (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$	1
17	a) On adding benzene diazonium chloride, aniline forms azo dye whereas ethylamine does not.	1
	b) On adding benzene diazonium chloride, aniline forms azo dye whereas benzylamine does not.	1
18	a) 1,3 - Butadiene and styrene / $n \text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2 + $  Styrene	1/2+ 1/2
	b) Hexamethylenediamine and adipic acid / $n \text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH} + n \text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_6\text{NH}_2$	1/2+ 1/2



19	$N_A = \frac{Z \times M}{a^3 \times d}$ $= \frac{2 \times 56 \text{ g mol}^{-1}}{(2.866 \times 10^{-8})^3 \text{ cm} \times 7.874 \text{ g cm}^{-3}}$ $= 6.04 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ <p>Or</p> $286.65 \times 10^{-10} \text{ cm} = 2.866 \times 10^{-8} \text{ cm}$ $\text{Mass of Fe atom} = (2.866 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 \times 7.874 \text{ g cm}^{-3} \times 1/2 = 23.54 \times 10^{-24} \times 3.94 \text{ g} = 92.59 \times 10^{-24} \text{ g}$ $N_A = 56 \text{ g mol}^{-1} / 92.59 \times 10^{-24} \text{ g}$ $= 6.04 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1½</p> <p>1½</p>
20	$R = 200 \Omega$ $\text{Cell constant} = \frac{1}{a} = 1 \text{ cm}^{-1}$ $\text{Conductivity, } k = \frac{1}{R} \times \frac{1}{a} = \frac{1}{200 \Omega} \times \text{cm}^{-1}$ $= 5.0 \times 10^{-3} \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$ $\wedge = \frac{K(\text{Scm}^{-1}) \times (1000 \text{ cm}^3 \text{ L}^{-1})}{C(\text{mol}^{-1})}$ $= \frac{(5.0 \times 10^{-3} \text{ Scm}^{-1}) (1000 \text{ cm}^3 \text{ L}^{-1})}{0.01 \text{ mol L}^{-1}}$ $= 500 \text{ Scm}^2 \text{ mol}^{-1}$	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
21	$\text{Log} \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left[ \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$ $\text{Log} \frac{2.39 \times 10^{-7} \text{ L}/(\text{mol.s})}{2.15 \times 10^{-8} \text{ L}/(\text{mol.s})} = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ/Kmol}} \left[ \frac{1}{650 \text{ K}} - \frac{1}{700 \text{ K}} \right]$ $\text{Log } 11.12 = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ}} \times \frac{700-650}{4.5 \times 10^5}$ $1.046 = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ}} \times \frac{700-650}{4.5 \times 10^5}$ $E_a = \frac{1.046 \times 2.303 \times 8.314 \times 10^2 \times 4.5}{50} = 180.16 \text{ kJ}$	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>




22	<p>Effect of temperature- physisorption decreases with increase of temperature and chemisorption first increases then decreases with increase of temperature</p> <p>Surface area – greater the surface area greater is the physisorption and chemisorption</p> <p>In physisorption, no appreciable activation energy is needed. In chemisorption, sometimes high activation energy is needed.</p>	1
OR		
22	<p>(i) Production of high vacuum: The remaining traces of air can be adsorbed by charcoal from a vessel evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum.</p> <p>(ii) Heterogeneous catalysis: Adsorption of reactants on the solid surface of the catalysts increases the rate of reaction.</p> <p>(iii) Froth floatation process: A low grade sulphide ore is concentrated by separating it from silica and other earthy matter by this method using pine oil and frothing agent</p>	1
23	<p>a) Due to incomplete filling of d-orbitals</p> <p>b) Because energy released in the formation of bond between Co(III) and ligand is more than the energy required for the conversion of Co(II) to Co(III).</p> <p>c) Due to comparable energies of 5f, 6d, 7s orbitals</p>	1
24	<p>a) Trioxalatocobaltate(III)</p>  <p>b) Hexacarbonylchromium(0)</p> 	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$





c) Trichloridoetheneplatinum(IV)



1/2+1/2

25

i)



1

ii)



1

iii)



1

26

The amino acids, which can be synthesised in the body, are known as nonessential amino acids.  
for example : glycine, alanine (or any other)

1+1/2

The amino acids which cannot be synthesised in the body and must be obtained through diet, are known as essential amino acids for example :valine, leucine (or any other)

1+1/2

27

a) Drugs usually interact with biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. These are called target molecules or drug targets which possess some common structural features, that may have same mechanism of action on target.

1

b) Food preservatives prevent spoilage of food due to microbial growth. For example table salt / sugar / vegetable oils / sodium benzoate (any one)

1

c) Non-ionic detergents do not contain any ion in their constitution. One such detergent is

28

a)

$$i = \frac{\text{Normal molar mass}}{\text{Abnormal molar mass}}$$

$$= \frac{\text{Observed colligative property}}{\text{Calculated colligative property}}$$


$$i = \frac{\text{Total number of moles of particles after association/dissociation}}{\text{Number of moles of particles before association/dissociation}} \quad (\text{any one})$$

i) For dissociation,  $i > 1$ ii) For association,  $i < 1$ 

b) Reaction



106g



84g

A mixture of 1 mol  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  and 1 mol  $\text{NaHCO}_3$  reacts with 3 mol of HCl1 mol  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  and 1 mol  $\text{NaHCO}_3 = 106 + 84 = 190$  g

190g mixture reacts completely with 3 mol HCl

Mol of HCl that will react with 1g =

$$\frac{3 \text{ mol}}{190 \text{ g}} \times 1 \text{ g} = \frac{3}{190} \text{ mol} = 3 \times \frac{3 \times 10^3}{190} \text{ m mol}$$

We know that

Molarity  $\times$  volume (ml) = no. of m mole

$$0.1 \times V_{\text{HCl}} = \frac{3 \times 10^3}{190}$$

$$V_{\text{HCl}} = \frac{3 \times 10^3}{190 \times 0.1} = 157.9 \text{ mL}$$

1

 $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$  $1\frac{1}{2}$  $\frac{1}{2}$ 

1

OR

28

a) i) It is defined as the number of moles of the component to the total number of moles of all the components /

Mole fraction of a component =

$$\frac{\text{Number of moles of the component}}{\text{Total number of moles of all the components}}$$

ii) It is defined as the number of moles of the solute per kg of the solvent. /

1

1



$$\text{Molality (m)} = \frac{\text{Moles of solute}}{\text{Mass of solvent in kg}}$$

iii) According to Raoult's law, the partial pressure of a volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in solution

b) Molar mass  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O} = 2 \times 23 + 32 + 16 \times 4 + 20 \times 1 + 16 \times 10 = 322 \text{ g mol}^{-1}$

No. of mol  $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  dissolved in 01.10kg of water

$$= \frac{6.00 \text{ g}}{322 \text{ g mol}^{-1}} = \frac{6}{322} \text{ mol}$$

Since there is complete dissociation, van't Hoff factor,  $i = 3$

$$\Delta T_f = i K_f m = i \times K_f \times n_b / w_A$$

$$= \frac{3 \times (1.86 \text{ K kg mol}) \times \frac{6}{322} \text{ mol}}{0.10 \text{ kg}} = 1.04 \text{ K}$$

Freezing point  $273.15 \text{ K} - 1.04 \text{ K} = 272.1 \text{ K}$

1

1/2

1

1/2

29

a) i)  $\text{XeF}_2$  - linear

ii)  $\text{XeO}_3$  - pyramidal

b) i) Because sulphur is sterically protected by six F atoms

ii) Bond dissociation enthalpy of  $\text{F}_2$  is lower than that of  $\text{Cl}_2$  involved in the process.

iii) Bond dissociation enthalpy of  $\text{HCl}$  is lower than that of  $\text{HF}$

1/2+1/2

1/2+1/2

1

1

1

OR

29

a)  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$  Fe Haber's process

Catalyst - iron oxide +  $\text{K}_2\text{O}$  +  $\text{Al}_2\text{O}_3$

Conditions: low temperature / 700 K and high pressure

b) i) Bond dissociation enthalpy of S-H bond is lower than that of O-H bond.

ii) Due to small size of N than P, lone pair is readily available for donation in  $\text{NH}_3$

whereas in  $\text{PH}_3$  lone pair is delocalized due to larger size of P

iii) Because S-S single bond is stronger than O-O single bond.

1/2

1/2


1/2+ 1/2

1


1

1



30	a) i) Heptan – 2-one	1
	ii) 3-phenylprop–2en-1-al	1
	b) i) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{[\text{O}]} \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{OH}^-} \text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-CHO}$	1
	ii) 	1
iii) $\text{CH}_3\text{COCH}_3 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{CH}_3\text{CH(OH)CH}_3 \xrightarrow{\text{Conc. H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$	1	
(or any other correct method)		

OR

30	a) i) $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-CH(Cl)-CH}_3$	1
	ii) 	1
	b) i) On heating with NaOH + I <sub>2</sub> , ethanal forms yellow ppt of iodoform whereas propanal does not.	1
	ii) Phenol gives red or violet ppt. with neutral FeCl <sub>3</sub> whereas benzoic acid does not (or any other test)	1
iii) Acetophenone- On heating with NaOH + I <sub>2</sub> , forms yellow ppt of iodoform whereas Benzaldehyde does not (or any other test)	1	

Sr. No.	Name	Sr. No.	Name
1	Dr. (Mrs.) Sangeeta Bhatia	4	Sh. S.K. Munjal
2	Dr. K.N. Uppadhyaya	5	Sh. Rakesh Dhawan
3	Sh. D.A. Mishra	6	Ms. Garima Bhutani

