



મનુષ્યમાં પ્રજનન

HUMAN REPRODUCTION



પ્રજનનતંત્ર (Reproductive System)



⇒ મનુષ્ય લિંગી પ્રજનન કરતો અચત્યપ્રસવી પ્રાણી છે.



નર (પુરુષ) ⇒ સુક્રકીર્મી (m)

માદા (સ્ત્રી) ⇒ અંડકીર્મી (m)



⇒ નર અને માદા જનનકીર્મીના ઐકાગ્રાચી ફલિતાંડ (2m) બને છે.






નર મનુષ્યના પ્રજનનતંત્રની અંતઃસ્થ રચના

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

- પ્રાથમિક પ્રજનન ઓર્ગાન (નર) = શુક્રપિંડ
- દ્વિતીય પ્રજનન ઓર્ગાન (નર) = અધિવૃષ્ણનલિકા, શુક્રવાહિની, શિશ્ન
- ત્રીજા પ્રજનન ઓર્ગાન = શુક્રાશય, પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથી, બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથી



શુક્રપિંડ → અધિવૃષ્ણ નલિકા → શુક્રવાહિની



શુક્રાશય



પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથી



બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્રંથી



શિશ્ન ← મુત્રજનન માર્ગ

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



① શુક્રિયંડ/વૃષણિયંડ/નર જનનિયંડ (ટેસ્ટીસ) = (Testis)

• સ્થાન = ઉદરગુદના બહાર વૃષણક્રિયળીમાં.

• વૃષણક્રિયળી = શરીરની બહાર આવેલી હોય છે.

→ શુક્રિયંડ જ્યારે ઉદરગુદમાં હોય ત્યારે જ તેનો વિકાસ શરૂ થઈ શકે છે ત્યારબાદ તે વૃષણક્રિયળીમાં ઉતરી આવે છે.

• કાર્ય = વૃષણક્રિયળી શુક્રિયંડનું નીચું તાપમાન મળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.

(વૃષણક્રિયળીનું તાપમાન શરીરના સામાન્ય તાપમાન કરતા 2 થી 2.5°C નીચું હોય)

→ આ તાપમાન શુક્રિયંડજનન માટે આવશ્યક છે.

• આકાર = અંડાકાર

• કદ = લં = 4 થી 5 cm

પ = 2 થી 3 cm

• રંગ = ગુલાબી રંગ ધરાવે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR


→ શુક્રિયંડની આંતરિક રચના =

→ દરેક શુક્રિયંડ ત્રણ આવરણ વડે આવરિત હોય છે.

બહારનું = ટ્યુનિકા વર્ગીનાસિમ્ (વૃષણ કંચુક)

મધ્યનું = ટ્યુનિકા આલ્બુમિનિયા (ચેલ કંચુક)

અંદરનું = ટ્યુનિકા વાસ્ક્યુલોસા (સંવાહની કંચુક)



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

• ટ્યુનિક વઝાઈનાલિસ =

→ તે શુક્રિયોનો પથવિસ્તાર કે જ્યાંથી શુક્રવાહિક અને ઘીતા શુક્રિયોમાં પ્રવેશી છે. તેના ત્રિવાય સંપૂર્ણ શુક્રિયોને આવરે છે.


• ટ્યુનિક આલ્બુગીનિયા =

→ તે ઘડ, વંતુમય સ્ફેદ આવરણ ઘરાવે છે. જે સર્ગો શુક્રિયોને આવરે છે.

→ યીતકંચુકનો પથ્થલાવ ત્રણે વર્ગે

અંક આયાત પડેલી રચાય = મધ્યસ્થ શુક્રિયો

→ તે અંદરની તરફ લંબાઈને શુક્રિયોને અર્ધક અંડોમાં વિભાજીત કરે છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR


• ટ્યુનિક વાસ્ક્યુલોસા = તે શુક્રિયોના અંડોના અંતઃઆવરણોનું નિર્માણ કરે છે.

→ દરેક શુક્રિયો આશરે 250 અંડો ઘરાવે છે. દરેક અંડોને શુક્રિયોડીય અંડિકાઓ કહે છે.

→ દરેક અંડોમાં અંકે થી ચાર અત્યંત ગુચળાવય નલિકા આવેલી હોય = શુક્રિયાદક નલિકા
Seminiferous tubule


→ શુક્રિયાદક નલિકા શુક્રિયો ઉત્પન્ન કરે છે. (આશરે 1000 શુક્રિયાદક નલિકા હાજર હોય છે.)
750 થી

શુક્રિયો =



શુક્રિયાદક નલિકા

ટ્યુનિક આલ્બુગીનિયા




શુક્રિયાદક નલિકા

આંતરાલીય કોષો
લેડિંગના કોષો

શુક્રિયોડીય અંડિકાની અંતઃસ્થ રચના.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



→ શુક્રાંત્રાદક નલિકામાં બે પ્રકારના કીમો મેલા મળે છે.

- નર જનન કીમો (શુક્રજનક કીમો)
- સ્ત્રીયોલી કીમો

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR

i) નરજનન કીમો/શુક્રજનક કીમો =

- તે અર્ધાંકરણ પામી શુક્રકીમનું નિર્માણ કરે છે.
- તે 4 થી 8 સ્તરોમાં ગોઠવાયેલું હોય છે.

ii) સ્ત્રીયોલી કીમો =

- શુક્રકીમની વચ્ચે ગોઠવાયેલી હોય છે.
- શુક્રકીમને પોષણ પુરૂ પાડવાનું કાર્ય કરે છે.



→ શુક્રાંત્રાદક નલિકાની બહારના ભાગમાં આંતરાલીય અવકાશ આવેલો હોય છે. જે નાની રૂઝિરવાહિની અને સંયોજક પેશી ધરાવે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR



→ સરટોલી કોષો/નર્સ કોષો/ સેલરેન્ટાક્યુલર કોષો =

→ જનન અધિરક્ષણના સ્તરમાં અમુક સ્તંભાકાર કોષો હોય ⇒ સરટોલી કોષો

(તે માત્ર સસ્તનમાં જ મળે)



• અન્ય કાર્યો =

→ તે ઈમ્યુન / મૂલ શુદ્ધિકર્મીનું લકાણ કરે.

→ તે શુદ્ધિત્વ અવસ્થાનું નિર્માણ કરે.

→ સરટોલી કોષો ઈન્ડોલીન અને ઓન્ટોગેનિસિન અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે.

→ તે ટેસ્ટોસ્ટેરોનમાંથી ઈસ્ટ્રોજનનું સંશ્લેષણ કરે છે.

→ તે શુદ્ધિકર્મ નિર્માણની પ્રક્રિયામાં પણ મદદ કરે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

→ શુદ્ધિવાદક નલિકાની મધ્યમાં આંતરાલીય કોષો/ લિડિંગના કોષો આવેલા હોય છે.



આ કોષોમાંથી નર મલીય અંતઃસ્ત્રાવ (એન્ડ્રોજન) ⇒ મુખ્યત્વે ટેસ્ટોસ્ટેરોન નો સ્ત્રાવ થાય છે.

→ અહીં શીગપ્રતિકરક કામતા મારેના સક્રિય કોષો પણ હાજર હોય છે.

→ નર મનુષ્યમાં સહાયક પ્રજનન નલિકાઓ તરીકે વૃષભાગ (Teste testis), શુદ્ધવાહિકાઓ (Vas deferentia), અધિવૃષભ નલિકા (Epididymis) અને શુદ્ધવાહિની (ductus deference) નો સમાવેશ થાય છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR





→ જાણીય અવસ્થા દરમિયાન શુક્રિયંડ ઉદરગુહમાં પિક્સી છે અને જન્મ સમયે તે વૃષ્ણકીચળીમાં પ્રવેશી છે.

• ક્રિપ્ટોકર્ડિડિઝમ = જન્મ સમયે જો શુક્રિયંડ વૃષ્ણકીચળીમાં ઉતરી ન આવે અને ઉદરગુહમાં જ રહે તો આ પરિસ્થિતિને ક્રિપ્ટોકર્ડિડિઝમ કહે છે.




મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

② શુક્રવાહિકાઓ (Vasa efferentia) =

→ શુક્રિયંડને અધિવૃક્ષાનલિકા સાથે મેડલી અત્યંત પાતળી & ભુક્ત નલિકાઓને શુક્રવાહિકા કહે છે.

→ શુક્રવાહિકા શુક્રિયંડમાંથી બહાર આવી દરેક શુક્રિયંડની પચ સપાટીએ સ્થાન પામેલ અધિવૃક્ષા નલિકામાં ખુલે છે.



③ અધિવૃક્ષા નલિકા (Epididymis) =

→ શુક્રકીષો શુક્રવાહિકા પ્રારા અધિવૃક્ષા નલિકામાં વહન પામે છે.

→ તે અત્યંત ગુચળાદાર & 6 મીટર લાંબી નલિકા છે.

→ કાર્ય = તે અપરિપક્વ શુક્રકીષોને હંગાળી સંત્રહ સ્થાન પુરૂ પાડે છે. જેમાં શુક્રકીષો પરિપક્વન પામે છે અને તરવાળી કામતા પ્રાપ્ત કરે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR





→ **અધિવૃક્ષણ નસિકાના ત્રણ ભાગ પડે છે.**

i) ઉપરનો વધુ ગુંચળામય ભાગ = **Caput Epididymis / ઊંચાત્ર મેજર**

ii) મધ્યભાગ = **Corpus Epididymis**

iii) તલસ્થ ભાગ = **Capda Epididymis / ઊંચાત્ર માર્દનીર**

ક્રય = અધિવૃક્ષણ નસિકા શુદ્ધક્રીષ્ણને ઘેરે મરિના મુઘી સંગ્રહ કરી રાખે છે.

↳ અહીં શુદ્ધક્રીષ્ણ ખોલાના ક્રય માટે પરિપક્વ થાય છે.

→ અધિવૃક્ષણ નસિકાની દિવાલ બે પ્રકારના કોષોની બનેલી છે. → જાદુ = વર્તુળી સ્નાયુનું સ્તર
↳ અંત : = અધિવૃક્ષણીય સ્તર

④ **શુદ્ધવાહિની (Vas Deference) =**

→ અધિવૃક્ષણ નસિકા ઉદરમાં ઉપરની તરફ શુદ્ધવાહિની તરીકે આપણ વધે છે & મુત્રાશયની ઉપર પાશ બનાવે છે.

→ તે 45 cm લાંબી નસિકા છે.

NEET = શુદ્ધવાહિનીનો અલિંગ પદ્ધતિ ભાગ = **એમ્યુલા**

↳ તેની દિવાલ બે સ્તરની બનેલી છે. → જાદુ = વર્તુળી સ્નાયુનું સ્તર
↳ અંત : = અધિવૃક્ષણીય સ્તર

→ શુદ્ધવાહિની આગળ વધે છે. & વૃક્ષણકોષોમાંથી બહાર ઈપીતેલ નસિકા મારફતે થઈ ઉદરગુદમાં જાય છે.

→ બંને શુદ્ધવાહિની મુત્રવાહિનીની આશપાશ વાંટળાય છે & ત્યારબાદ પદ્ધતિ થઈ **એમ્યુલા** નું નિર્માણ કરે છે.



- દરેક બાકુની ઝેમ્યુલા લેમની શુક્રાશયનલિકા સાથે મળે છે.
- શુક્રવાહિની સ્ખલનનલિકાનું નિર્મોહ કરે છે. જે પ્રોસ્ટેટ મુત્રજનનમાર્ગમાં ખુલે છે.
- મુત્રાશયમાં 1 થી 2 શુક્રાશય મુત્રાશયની પાંચ બાકુઓ સ્થિત છે. જે સ્વંત્ર રીતે શુક્રવાહિનીના સંક્રમણ લાગતા ખુલે છે.
- શુક્રવાહિનીઓના સંક્રમણ લાગો મળી દરેક બાકુ એક સ્ખલન નલિકાની રચના બનાવે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



સહાયક પ્રજનન નલિકાઓ

- શુક્રાશય (એક થીડ)
પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ (માત્ર એક)
ભલ્લો યુરેથ્રલ ગ્રંથિ (એક થીડ)
- } → આ ગ્રંથિઓ વીંચી પેદા કરે છે.

→ શુક્રાશય (seminal vesicle) = શુક્રવાહિનીનો દુરસ્થ છેડો પછીની પ્રદેશ બનાવે છે કે જે શુક્રાશયમાં ખુલે છે.



ત્યારબાદ તે સ્ખલન નલિકા તરીકે ઓળખાય છે.

- મુત્રજનનમાર્ગ = મુત્રવાહિની સ્ખલન નલિકા સાથે મિલવાઈને હવે લેને.....

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



• સ્થાન = મુત્રાશયના પાયાના ભાગે.

• સ્ત્રાવ = શુક્રાશય રક્ષા બનાવે.



→ ઘેર, ચીકણાયુક્ત, પીળાશ યુક્ત, પીંચકલત્વો યુક્ત (વીર્યનું 60% પ્રવાહી બનાવે)
કેલ્શિયમ, કુકેરોઈ શર્કરા, Vit 'C' તથા અન્ય ઉત્સેચકી...

• કાર્ય = શુક્રકેષને પોષણ પુરૂ પાડવાનું કાર્ય કરે છે.

• શુક્રકેષનો મુત્રજનન માર્ગમાં પ્રવેશ = દરેક શુક્રાશયની નલિકા શુક્રવાહિની સાથે મેડાઈને રક્ષણ નલિકા બનાવે છે.

→ શુક્રકેષો શુક્રાશય મળાહી સાથે મુત્રજનન માર્ગમાં પ્રવેશ કરે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

→ પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ (Prostate Gland) = (વીર્યનું 30% પ્રવાહી)


• સ્થાન = મુત્રાશયના પાંચ પ્રદેશમાં થીવા મળે છે.

• સ્ત્રાવ = લેનો સ્ત્રાવ દુધ જેવો (આલ્કલાઈ) થીવા મળે છે.

• કાર્ય = તે શુક્રકેષને સહાય બનાવે છે.

→ જે શુક્રકેષની પ્રચલન ક્ષમતા અબાવવા ખુબ જ ઉપયોગી છે.

NEET = લેના સ્ત્રાવમાં સાઈટ્રિક અમ્લિડ, કેલ્શિયમ, કૅમ્ફેર, ક્ષોરિંગ ઉત્સેચકી થીવા મળે છે.



→ બલ્બો - યુરેથ્રલ ગ્રંથિ (Bulbo-urethral Gland) = કઉપરની ગ્રંથિ

• સ્થાન = મુત્રજનન માર્ગની પાંચ બાજુએ આવેલી છે. તે પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિની નીચે ગાંઠવાયેલી હોય છે.

• સ્ત્રાવ = તે આલ્કલીય પ્રવાહીનો સ્ત્રાવ રાજે છે. (એસીડ = PH-7.2)

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

- કાર્ય = સમાગમ દરમિયાન ઘર્ષણ મિશ્રિત પ્રવાહી તરીકે વર્તે છે.
- તે વીર્યનું 10% પ્રવાહી બનાવે છે.

⇒ વીર્ય / Semen =

(શુક્રકેષી + પ્રણય સહાયક પ્રજનન ગ્રંથિના સ્રાવ) = વીર્ય

→ વીર્ય એ કુલ જેવું પીળાશ પડતું ઘટ્ટ સ્વિજરાયુક્ત આલ્કલીય પ્રવાહી છે.

- SC = 3 થી 4 મી
- PH = 7.3
- સામાન્ય સ્પર્શ ક્ષમતા = 20 થી 120 મિલિયન / મિલી

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



MP SIR Power Notes for NEET



- સોલિડોસ્પર્મીયા < 20 મિલિયન / મિલી
- ઓસ્ત્રીયર્મીયા = શુક્રકેષીની ગેરહાજરી અથવા લગભગ ગેરહાજરી
- ઓસ્ત્રીયર્મીયા = વાર્ધક્ય શુક્રકેષીની અસિવતા ઘટાડે.
- ટેસ્ટીસર્મીયા = શુક્રકેષીની અનિયંત્રિત વૃદ્ધિની બાધાકાર સ્થિતિ.
- વર મનુષ્ય દરેક મૈથુન દરમિયાન 200 થી 300 મિલિયન શુક્રકેષીનો ત્યાગ કરે છે.
- ફળપ્રુથતા માટે = 60% શુક્રકેષી સામાન્ય.
40% શુક્રકેષી અસિવતા ધરાવતા હોય.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



- મુત્રજનનમર્ગો સ્નાયુમય અને નળાકાર સ્વંગમ આપણ વધે છે = શિશ્ન
- શિશ્નાત્રા = શિશ્નના છેડાનો ભાગ કુલિલો હોય જોઈએ....



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

- શિશ્નાત્રા ત્વચા દ્વારા આવરિત હોય = અન્નત્વચા (Prepuce/foreskin)
- અન્નત્વચામાં વિશિષ્ટ ગ્રંથિ આવેલી હોય જોઈએ પ્રિપુટીય ગ્રંથિ કહે છે. = અન્નત્વચાગ્રંથિ
Preputial gland

- શિશ્ન એ ઉત્પાનમય મૈથુન માટેનું પ્રવેશી સ્વંગ છે (મૈથુનસ્વંગ)
- કુરુ = શિશ્નનો વલભાગ સ્નાયુ ધરાવે છે.
- શિશ્ન લાંબા હંડ જેવી રચના છે. જે ટીશ્નના ભાગે શિશ્નાત્રા ધરાવે છે.

NEET =

- Oorchiopexy = લાગણમાં જ્યારે વૃક્ષલકીયળીમાં ન આવેલા સ્પર્શકિંડને સ્થાપિત કરવા માટેની કાર્યવાહી
- ઓર્કિઓપેક્સી = વૃક્ષલકીયળીમાં લાવવામાં આવે તેને....

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR



→ શિશ્ન તંતુમય પેશી વડે ઝેડાયેલ ત્રણ નળાકાર સમૂહથી બનેલી છે.

ત્રણ પૈકી → બે સમૂહ = ઘૂષ બાનુબે
→ એક સમૂહ = વડા બાનુબે

→ ત્રણેય સમૂહ ઔષ્ણિક રૂઢિરક્તિશો દ્વારા છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

→ ઔષ્ણિક ઉત્તેજના સમયે તે રૂઢિરક્તિ બરાબ છે જેથી શિશ્ન ઓટુ વે કડક બને છે.



ઉત્થાન / Erection

→ સામાન્ય સંબંધગામ શિશ્ન નાનુ, શિથિલ હોય છે.

→ શિશ્નનુ ઉત્થાન = પરાનુકંપી ચેતાતંત્ર

વીર્યનુ સ્રાવન = ઔષ્ણિક ચેતાતંત્ર

NEET = નર પ્રજનનતંત્ર = ઔષ્ણિક સ્રાવ.

• **FSH** = શુક્રજનક કીમીનુ ધર્મીય, વિશ્રમ & ABP (Androgen Binding protein) નો સ્રાવ કરે છે.

• **ABP** = શુક્રોત્પાદક નલિકામાં ટેસ્ટોસ્ટેરોનનુ સંચયન પધારે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR





→ ૧ શેડ ઝાંડપિંડ, ૧ શેડ ઝાંડવાહિની, ગર્ભાશય, ગ્રીવા, યોનિમાર્ગ & યોનિદ્વાર

• અધ્યયક પ્રજનન ઝાંડગી = મુખ્ય ભગોષ્ઠ, ગોણ ભગોષ્ઠ, લગ શિખનીક, ૧ શેડ સ્તનગ્રંથિ



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

① ઝાંડપિંડ / માદા જનનપિંડ / ovary =


• સ્થાન = માદા મનુષ્યમાં ઉદરના નીચેના ભાગે (અપેરિયન ક્ષેત્ર) મા દરેકે બાજુએ એક-એક ગોઠવાયેલા હોય છે.

→ નિતંબગુદાની ઉપરની તરફ & ગર્ભાશયની હેઠળે બાજુએ એક-એક હોય.

→ ઝાંડપિંડો નિતંબની દિવાલ તથા ગર્ભાશય સાથે અસ્થિબંધ વડે જોડાણ ધરાવે છે.

• આકાર = બદામ જેવો આકાર ધરાવતી ગ્રંથિ...

• કદ = $\begin{cases} લં = 2 \text{ થી } 4 \text{ cm} \\ પ = 2 \text{ cm} \\ જ = 1 \text{ cm} \end{cases}$



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR




→ દરેક અંડપિંડ પાલળા અધિરક્તીય અવસ્થા
ત્રારા આવરિત હોય છે. = જનન અધિરક્ત

→ અંડપિંડ નાલિકેન્ડ્રા ધરાવે છે. જેના
વડે રૂધિરવાહિનીઓ & ચેલાઓ
અંડપિંડમા પ્રવેશે છે.

→ અંડપિંડની ફરતે આવેલા
ફોલિક્યુલ સંયોજક પેશીના
આવરણને = ટ્યુનિકા આલ્બુમિનિયા

→ અંડપિંડના સૌથી અંદરના ભાગને
અંડપિંડીય આધારક કહે છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR


→ અંડપિંડીય આધારક ને બે ભાગમાં વહેંચાય છે.

બાહ્યક

મજ્જક

- પરિધવર્તી ભાગ
(બહારનો ભાગ)
- કિન્નવર્તી ભાગ
(અંદરનો ભાગ)
- તેમા પુટિકાઓ
આવેલી થયેા
મળે છે.
- તે સંયોજક પેશી
ધરાવે છે.

ટ્યુનિકા → જનન → બાહ્યક → મજ્જક
આલ્બુમિનિયા અધિરક્ત



સસ્તનના અંડપિંડની આકૃતિ

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

→ ઍંડપિંડના જાદુક્રમ ધાવેલી પુટીકાઓની સંખ્યા ----

સ્ત્રીના જન્મ સમયે = લાખો ઍંડપુટીકાઓ


યુવાવસ્થા = 60,000 થી 80,000 ઍંડપુટીકા

પ્રજનનકાળ દરમિયાન = 300 થી 400 ઍંડપુટીકા

• ઍંડપિંડીય ચક્ર = ઍંડપિંડમાં ઍંડપુટીકાનું નિર્માણ & વિકાસની ઘટનાને.....

NEET =


• સ્નાયુલંઘ = ઍંડપિંડી લેગની સ્થિતિ દર્શાવે છે. સ્નાયુલંઘ દ્વારા જાણવી શક્ય છે...



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

• માદા મનુષ્યનું પ્રજનનતંત્ર (માત્ર સમજૂતી માટે)



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

② ઍંડવાહિની (ફિલોપિયન નલિકા) - oviduct

→ ઍંડપિંડના પરિધ વિસ્તારથી ગર્ભાશય સુધી લંબાયેલી નલિકા છે જેને “ગર્ભાશય નળી” કહે.

• લં = 10 થી 12 cm

• સ્થાન = ગર્ભાશયના સ્નાયુલંઘની ગળીઓ વચ્ચે ગોઠવાય....

→ ઍંડવાહિની નિવાય = ઍંડપિંડ નજીક સ્થિત ગળી જેવા સ્થાનરના ભાગને...

→ ફિમ્બ્રી = ઍંડવાહિની નિવાયની કિનારીઓ સ્થાંગળી જેવા પ્રવર્ધો ધરાવે છે.

↳ તે ઍંડપાત બાદ મુક્ત થતા ઍંડકોને સંગ્રહિત કરવામાં મદદ કરે છે.

→ તુબિલસ = ઍંડવાહિની નિવાય ઍંડવાહિનીના મધ્ય પહોળા ભાગ તરફ સ્થાંગળ દિશામાં લેવે...

→ ઈસ્ટિમસ = ઍંડવાહિનીના સંતભાગને...

↳ જે સંકુલ પોલાણ ધરાવે છે જે ગર્ભાશય સાથે મિલેય છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

③ ગર્ભાશય / Uterus

→ તે મુત્રાશય અને મળાશયની વચ્ચે સ્થિત હોય છે. તેને “કુપ્ત” પણ કહે છે.

→ તેનો આકાર ઉંઘો નાસપતિ આકારનો હોય છે.

→ તે નિતંબની દિવાલ સાથે જોડાયેલ સ્થિતિજંઘ દ્વારા આધાર પામેલ હોય છે.

→ ગર્ભાશયની દિવાલ ત્રણ પેશીય સ્તરો બનાવે છે.



ઍન્ડોમેટ્રિયમ

માયોમેટ્રિયમ

પેરિમેટ્રિયમ

- સૌથી ઍંદરનું ક્રીયાશીલ સ્તર.
- તે ગર્ભાશયગુહાનું સ્તર બનાવે.
- જે ફલન થાય તો, ફલિત ઍંડકો નું સ્થાપન અહીં થાય છે.
- જે સ્ત્રી ગર્ભવતી ન બને તો સમયાંતરે (28 દિવસે) આ સ્તર ખરી પડે છે.


- ગર્ભાશયનું વિશાળ મધ્યસ્તર છે.
- સ્થિતિજંઘ સ્નાયુનું મુક્ત સ્તર
- બાળકના જન્મ સમયે સ્થિતિજંઘ લુપ્ત થાય છે.

- ગર્ભાશયનું સૌથી બહારનું સ્તર છે.
- તે સૌથી પાતળું સ્તર છે.


મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR


ગર્ભાશયના સ્તરો



પેરીમેટ્રીયમ
ગર્ભાશયનું બાહ્ય સ્તર



માયોમેટ્રીયમ
ગર્ભાશયનું મધ્યસ્તર



એન્ડોમેટ્રીયમ
ગર્ભાશયનું અંતઃસ્તર



ગર્ભાશયમાં વિકસિત બાળક

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR

- ગ્રીવાનળી = ગર્ભાશય યોનિમાર્ગમાં સાંકળી ગ્રીવા દ્વારા ખુલે છે. ગ્રીવાની ગુહાને "ગ્રીવાનળી" કહે.
- જન્મનળી = ગ્રીવાનળી યોનિમાર્ગ સાથે જોડાઈને "જન્મનળી" બનાવે છે.

④ યોનિમાર્ગ & યોનિદ્વાર =

- યોનિમાર્ગ એ મઝી દિવાલવાળી નલિકા છે. જે ગર્ભાશયને શરીરની બહાર ખુલે છે.
- યોનિમાર્ગ પ્રસવ અને ઝડપુસ્ત્રાવને શરીરની બહાર કાઢવાનો માર્ગ પુરી પાડે છે.
- યોનિમાર્ગના દુરસ્થ છેડે રહેલિમકાથી બનેલી પાતળી ગળી આવેલી છે. → યોનિદ્વાર
Hymen

- તે ક્રીઈ પાત્ર સમયે સતત કસરત કે અન્ય કારણોથી તુટી પડે છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)



MAULIK PANCHAL SIR



બાહ્ય જનનેન્દ્રિયો / વુલ્વા / પ્યુડેન્ડમ

→ તેમાં મુખ્યત્વે પાંચ અંગોનો સમાવેશ થાય છે.

- ① મોન્સ પ્યુબિસ (Mons pubis)
- ② મુખ્ય લગોણ (Labia Majora)
- ③ ગોણ લગોણ (Labia Minora)
- ④ ભગશિખીકા (Clitoris)
- ⑤ યોનિપટલ (Hymen)



① મોન્સ પ્યુબિસ = તે મેદપેશીથી બનેલી ત્વચા દ્વારા આવરિત અને પ્યુબિક વાળ દ્વારા ઘેરાયેલી ગાદી જેવી રચના ધરાવે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR


② મુખ્ય લગોણ = (નરની ત્વચાકીચળી ને સમકક્ષ રચના)

- સ્થાન = મોન્સ પ્યુબિસની નીચે અને બાહ્ય જનનાંગોની ફરતે આવેલા છે.
(યોનિમાર્ગના મુખને ઘેરીને ગોઠવાયેલી રચના છે.)

→ તે સંસર્ગ પેશીયુક્ત ગળીમય રચના છે.

③ ગોણ લગોણ =

- સ્થાન = મુખ્ય લગોણની નીચે એકે મેડ ..
→ પેશીયુક્ત ગળીમય રચના.



④ ભગશિખીકા =

- સ્થાન = તે નાની આંગળી જેવી રચના છે. જે મુત્રમાર્ગના મુખની ઉપર કે બ ગોણ લગોણના ઉપરી મેડાલ સ્થાને આવેલી હોય છે.

→ તે ઉત્થાન પેશી ધરાવે છે.

એર્પર્સ કેવરનોસા

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR





NEET =

- લગશ્ચિમ્નીકા નરના શિશ્નને સમકક્ષ રચનાઓ છે.
- તે પ્રજનન નલિકાના અભાવે શિશ્નની જુદી પડે છે.

→ યોનિમાર્ગના અલિપ્ત છેડે મુત્રમાર્ગ સ્વતંત્ર રીતે ખુલે છે અને તે એક સામાન્ય ગુદા રચે છે.
જેને વજઈનલ વેસ્ટીબ્યુલ / મુત્રજનન કોર

→ યોનિમુખમાં બે છિન્ને આવેલા છે.

- (a) મુત્રમાર્ગનું છિદ્ર = અત્રસ્થ છેડે આવેલું
- (b) યોનિદ્વાર = પશ્ચ છેડે આવેલું

→ યોનિપટલ (Hymen) તરીકે ઓળખાતા સ્લેષ્મ પટલ વડે અપૂર્ણ રીતે બંધ હોય છે.



યોનિપટલની હાજરી કે ગેરહાજરી કૌમાર્યની અથવા મતીય અનુભવ નું વાસ્તવિક મુશ્કેલ માનવામાં આવતી નથી.


મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

→ યોનિપટલ પ્રચક મૈથુન દરમિયાન તુરે છે. એકે, અંકુશક પડી જવાથી અથવા અંકુશક, વજઈનલ ટેન્શનને દાખલ કરવાથી, રમતો રમવાથી, સાવકસિંગા વગેરેની તુટી શકે છે.

→ બર્થોલિન નલિકાનું છિદ્ર = તે નરની ક્રિપર ગ્રંથિ ને સમમુલક છે.

- યોનિમાર્ગની પાંચીય બાજુએ એક મેડી બર્થોલિન / ગ્રીટર વેસ્ટીબ્યુલર ગ્રંથિ આવેલી છે.
- તે મૈથુન ઉત્તેજના દરમિયાન આલ્કલાઈન પ્રવાહીનો સ્રાવ કરે છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR




⑤ સ્તનગ્રંથિ (Mammary gland) =

→ ફિયાહીલ સ્તનગ્રંથિએ જ્યાં જ માદા લક્ટેશન લાક્ટેલેક્ટા છે.

→ સ્તનગ્રંથિ ગ્રંથિમય પેશીક તિનન માત્રામાં આવેલી ઘસવલી થીડમાં આવેલ રચના છે.


→ પ્રત્યેક સ્તનની સ્તનગ્રંથિ 15 થી 20 ખંડો = સ્તનખંડો

→ સ્તનખંડો કુચિકાઓની જીભાઓવાળા કીધીના સમુહો ધરાવે છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



• દુધનો સ્રાવ = કુચિકાઓના કીધી દ્વારા સ્રાવ પામતુ દુધ કુચિકાઓના પીલાણમાં (ગુદામાં) સ્રાવ થાય છે.


⇒ સ્તનનલિકા = સ્તનકુચિકા સ્તનનલિકામાં ખુલી છે.

⇒ સ્તનનળી = દરેક ખંડની નલિકાઓ ભેગી થઈને સ્તન નળી બનાવે છે.

⇒ સ્તનલુંગિકા = જ્યાં સ્તનનળીઓ ભેગી થઈને સ્તનલુંગિકા બનાવે છે. જે દુધનળી (Lactiferous duct) માંથી ઓળાવેલી છે. જેના દ્વારા દુધ સ્રાવવાની જાવા નીકળે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



→ ગ્રંથિમય પેશી → સ્તનખંડી → સ્તન કુપિકા

દુધનળી ← સ્તનલુંબિકા ← સ્તનનળી ← સ્તનનલિકા

→ સ્તનગ્રંથિ પોષકતત્વો યુક્ત પ્રવાહી દુધ પુરૂ પાડે છે.
જે બાળકને પીસણ પુરૂ પાડે છે.

→ જન્મ સમયથી ફેરલાક મહિનાઓ સુધી દુધ અને
બાળકને ઘણા સેપી સેગીયી રક્ષણ પુરૂ પાડે છે.

→ સ્ત્રીની સ્તનગ્રંથિ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ટિર્ભદન
પામે છે. ગર્ભાવસ્થાના અંત સુધીમા દુધ નિર્મિતની
શરૂઆત કરે = લેક્ટેશન

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



MP SIR Power Notes for NEET

- સૌથી નાના અરેખિત સ્નાયુઓ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન ગર્ભાશયની દિવાલમા ઝીવા મળે છે.
- ભગશિશ્નીક્ર અને પુરૂષના શિશ્નને સમતુલક છે.
- બર્થોલિન ગ્રંથિ પુરૂષમાં ક્રિપરની ગ્રંથિને સમતુલક છે.
- સક્રિય સ્તનગ્રંથિ માદા સસ્તન પ્રાણીનુ લક્ષણ છે.

→ લેક્ટેશનના સ્વરૂપમાં દિવસોમાં નિમોળ પામતુ દુધ કોલોસ્ટ્રમ કહેવાય.



તે નવમત શિશુઓમાં પ્રતિકરના વિકાસ માટે અવશ્યક અન્ટિબોડી (IgA) ધરાવે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR







જન્યુજનન (Gametogenesis)

⇒ મુખ્ય મલીય અંગો = નર = શુક્રિંડ
માદા = અંડિંડ


• જન્યુજનન / Gametogenesis = શુક્રિંડો દ્વારા શુક્રકીર્મિ અને અંડિંડો દ્વારા અંડકીર્મિ ઉત્પન્ન થાય.
↳ આમ, નર અને માદા જન્યુન। નિર્મીણને જન્યુજનન કહે છે.



HUMAN SPERM (SPERMATOZOA)



HUMAN EGG (OVUM)



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



શુક્રકોષજનન (Spermatogenesis)


જો અપરિપક્વ નરજનન કીર્મી (આદિ શુક્રકીર્મી) માંથી શુક્રકીર્મીના નિર્મીણની ઘટનાને = શુક્રકીર્મીજનન

→ શુક્રકીર્મીનું ઉત્પાદન યોગનારંભે શરૂ થાય છે.

→ તેના મુખ્યત્વે બે તબક્કા છે.

i) પ્રશુક્રકીર્મીનું નિર્મીણ (formation of spermatids)

ii) શુક્રકીર્મીજનન (spermiogenesis)




મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



□ શુક્રકોષજનન (Spermatogenesis)



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

- આદિશુક્રકોષો શુક્રતપાદક નલિકાઓની દીવાલની અંદર હોય છે.
- તે અભવિભાજન દ્વારા ગુણન પાત્રી સંખ્યામાં વધારી કરે.
- તે 2n (46) રંગામુખો ધરાવે છે.

→ આદિશુક્રકોષો સમયાંતરે અર્ધાકરણ પામે છે. અને પ્રાથમિક પુર્વ શુક્રકોષ (2n) નું નિર્માણ થાય છે.

→ હવે, પ્રાથમિક પુર્વ શુક્રકોષનું અર્ધાકરણ થાય છે અને બે સમાન અંકકીય દ્વિતીયક પુર્વ શુક્રકોષ (n=23) નું નિર્માણ થાય છે.

→ દ્વિતીયક પુર્વ શુક્રકોષોમાંથી ચાર સમાન અંકકીય પ્રશુક્રકોષનું નિર્માણ થાય છે.

→ શુક્રકોષાંતરણ = પ્રશુક્રકોષો નું અંતર શુક્રકોષોમાં થાય છે તો ...
Spermiogenesis



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR


→ શુદ્ધજાત્યારણ બાદ શુદ્ધકીર્મણુ રીધ્ સરટોલી કીર્મણમાં રચાચિત થાય છે.



શુદ્ધકીર્મણુ શુદ્ધિત્પાદક નલિકામાંથી મુક્ત થાય છે. (spermiation)



SPERMATION



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



નર પ્રજનન અંતઃસ્ત્રાવ

→ શુદ્ધજાત્યારણ બાદ શુદ્ધકીર્મણુ રીધ્ સરટોલી કીર્મણમાં રચાચિત થાય છે & શુદ્ધિત્પાદકનલિકામાંથી મુક્ત થાય છે. આ ઘટનાને spermiation (શુદ્ધકીર્મણુ મુક્ત થવાની દિયા) કહે છે.

→ શુદ્ધકીર્મણનની શરૂઆત યૌવનારંભે જન્મ = ગીનેડો ટ્રોપીન રિલિઝિંગ હોર્મોન ના સ્ત્રાવના વધારો થવાથી થાય છે.



LH = લ્યુટીનાઈઝિંગ હોર્મોન

→ તે લીડિંગના કીર્મણ પર કાર્ય કરે છે.



અંત્રોજનન ના સંસ્લીષણ અને સ્ત્રાવને પ્રેરે છે.

→ ટેસ્ટોસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ થાય. (શુદ્ધકીર્મણનની દિયાને ઉતેજે)

[અત્રિયરુદ્ધી ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રાવ પામતા અંતઃસ્ત્રાવો]

FSH = ફોલિકલ સ્ટીમ્યુલેટિંગ હોર્મોન

→ તે સરટોલી કીર્મણ પર કાર્ય કરે છે.



→ તે કિટલાક કારકીના સ્ત્રાવને ઉતેજે છે. અને શુદ્ધજાત્યારણમાં મદદ કરે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR



- ઇન્ડીબીન = વધુ પ્રમાણમાં થતા શુક્રકોષજનનના પ્રતિબંધકો, સ્ત્રીયોની ક્રિયા પ્રતિબંધક તરીકે કાર્ય કરે છે.

→ તે અત્યંત ઓછા અને ઓછા પ્રમાણમાં ની નકારાત્મક પ્રતિબંધક નિયમન આપે છે

પરિણામે FSH ના સંસ્કૃતિય & કાર્યમાં ઘટાડો થાય છે.
(શુક્રકોષજનનની દ્રિયા ઘટે)



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

□ શુક્રકોષની અંતઃસ્થ રચના


- શીર્ષ, ગ્રીવા, મધ્યભાગ અને પુંછડીથી બનેલી શુક્રમદર્શક રચના છે.
- કોષરક્ષપટલ = તે શુક્રકોષના સમગ્ર દેહને આવરી લે છે.

- શુક્રકોષનું શીર્ષ = શુક્રકોષનું શીર્ષ વિસ્તૃત હોય છે, જે અંકુશકીય (ગ) ક્રિયાકેન્દ્ર ધરાવે છે.

- શુક્રાંત્ર (Acrosome) = શીર્ષનો અંતર હોડો ટીપી જેવી રચના શુક્રાંત્રની ધરાયેલો હોય છે.

- શુક્રકોષનું શીર્ષ અંકુશકીય ટીપીની ઠંડાપેલું છે. જેને શુક્રકોષ શીર્ષની ટીપ (ન્યુક્લિયસ ટેપ) કહેવાય છે.

- શુક્રકોષનું શીર્ષ મોટી ક્રિયાની જેવી રચના છે, જે લાયન્ગીન ઉત્સર્જક ધરાવે છે.




મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

- ઉત્સર્જક = શુક્રાન્ત્ર વર્ગ અંડકીયને ક્ષતિ કરવામાં મદદ કરતા ઉત્સર્જકીય ભરેલા છે.
↳ હાયલ્યુરોનિક ડિસેક

⇒ શુક્રકીયનો મધ્યભાગ =

- તે અક્ષાંક્ય કણાલમુતો ઘરાવે છે.
- કણાલમુતમાંથી પ્રાપ્ત થતી શકિતની મદદથી તે પુંછડીથી હલનચલન કરે છે.
- ફલન માટે જરૂરી શુક્રકીયની અસિતતા માટેની સાનુકુળતા પુરી પાડે છે.



પ્રશુક્રકોષ

પરીપક્વ શુક્રકોષ

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

• શુક્રકીયની સંખ્યા અને કુમતા =


- પુરૂષ મૈથુન સમયે લગભગ 200 થી 300 મિલીયન જેટલા શુક્રકીયનો ત્યાગ કરે છે.
- 60% શુક્રકીય = સામાન્ય આકાર & કદ
- 40% શુક્રકીય = શકિતશાળી હલનચલન.

✱ MP's Power Notes for NEET =

- શુક્રકીયના મધ્યભાગના અગ્રભાગમાં સાંકળી અથવા આવેલી છે.
- જેને (ગ્રીવા) કહે છે.

↓
નિકટવર્તી & દુરસ્થ તારાકેન્દ્ર ધરાવતો ભાગ.

- નિકટવર્તી ભાગ નક્કર પ્રોટીનના લંતુથી આવરિત (9+2) અથવા આવેલી છે.



Structure of sperm

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



શુક્રકાયાંતરણ

→ પ્રશુક્રક્રીયનું પરિપક્વ શુક્રક્રીયમાં રૂપાંતરણ ૦૪ વિભિદન થવાની ઘટનાને ---

(i) ક્રીષકેન્દ્રમાં ફેરફાર = પ્રશુક્રક્રીયનું ક્રીષકેન્દ્ર પાળી ગુમાવી સંકેતિય & ઈંડા જેવો પાશ્ચીય બ્રાહ્મર દારણ કરે છે.

→ તેમાં DNA વધુ ભાર્યું બને છે અને RNA ક્રીષકેન્દ્રિક કદ ઘટે છે.

(ii) શુક્રાગ્ર નિર્માણ = શુક્રાગ્રનું નિર્માણ ગીલગીજયમાંથી થાય છે.

→ ગીલગીજય શુક્રક્રીયના બ્રાહ્મર છેડા નજીક સંકેન્દ્રિત થાય છે.

→ ગીલગીજયની બીજ કે બે રસદાનીઓ મીટી થઈ ગીલગીજયની નવિકાની વચ્ચે સ્થાન પામે છે.

→ રસદાનીમાં ગીય કળિજબો વિગ્રસ પામે છે જેને પ્રશુક્રાગ્ર કળિજ કહે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



→ પ્રશુક્રાગ્ર કળિજબો ક્રીષકેન્દ્રના બ્રાહ્મર (બ્રાહ્મર છેડે) સંકેન્દ્રિત થઈ વિશાળ બને છે જેને શુક્રાગ્ર કહેવાય.

↳ ઘાયલ્યુબીનિક્ક (પ્રોટીએઝ પ્રકારનો ઉલ્સિક)

જે શુક્રક્રીયને અંડક્રીયમાં દાખલ થવામાં મદદ કરે છે.

(iii) લારાકેન્દ્ર & કળાલમુત્રો = પ્રશુક્રક્રીયના બે લારાકેન્દ્ર બીજ પછી બીજ બીજ ક્રીષકેન્દ્રની પાછળ ગોઠવાય છે.

→ બ્રાહ્મર = બ્રાહ્મર લારાકેન્દ્ર

પચ્ચ બીજની = દુરબ્ધ લારાકેન્દ્ર

→ દુરબ્ધ લારાકેન્દ્ર તલકળિજમાં ફેરવાય અને શુક્રક્રીયનો બ્રાહ્મર તંતુ બનાવે છે.

→ કળાલમુત્ર લેગા મળીને બ્રાહ્મર તંતુની ફરતે સર્પાકરે વાંટળાય છે & શુક્રક્રીયનો મધ્યભાગ બનાવે છે.

→ પરિપક્વ શુક્રક્રીય (૪) બને છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR





અંડકોષજનન (Oogenesis)



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

પરિપક્વ માદા જનનક્રીયા નિર્માણની દ્રિયાને = અંડક્રીયજનન
Oogenesis

અંડક્રીયજનન ગર્ભપિંડમાં દરમિયાન શરૂ થાય છે. જ્યારે દરેક અંડપિંડમાંથી લાખો જનનક્રીયાક્રીયા (આદિ પુર્વ અંડક્રીયા) વિકાસ પામે છે.

જન્મ લાદ વધારાના આદિ પુર્વ અંડક્રીયા નિર્માણ પામતા નથી.

હવે આદિ પુર્વ અંડક્રીયા વિભાજન પામવાનું શરૂ કરે છે. = પ્રાથમિક પુર્વ અંડક્રીયા માં ફેરવાય.
Primary Oocyte

પ્રાથમિક પુર્વ અંડક્રીયા (2n) ગ્રંથિય ક્રીયાના સ્તર વડે ધરાય = પ્રાથમિક પુટિકા



પ્રાથમિક પુટિકા ગ્રંથિય સ્તરે અને ઘણા સ્તરોથી આવરિત દ્વિતીય પુટિકા થાય લીને...

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



→ યુવાવસ્થાના પ્રારંભ સમયે અંડચંદ્રમાં 60,000 - 80,000 પ્રાથમિક પુટીકા હોય છે.

ફોલિક્યુલ પુટીકા → તૃતીયક પુટીકા



તે પ્રવાહીથી ભરેલી ગ્રંથિ ધરાવે = અંદ્રમ/Antrum

→ તેનું અંદરનું સ્તર = અંતઃઆવરણ

બહારનું સ્તર = બાહ્ય આવરણ

→ પ્રાથમિક પુર્વ અંડકીય વૃદ્ધિ કરે છે અને પ્રથમ અર્ધકરણ વિભાજન પુર્ણ કરે છે.



તેના પરિભ્રમ મોટા કદના એકકીય કોષો (ફોલિક્યુલ પુર્વ અંડકીય)-ના ૧ નાના કદનો એકકીય - ન કોષ (પ્રથમ દ્વિધ્રુવ)-ના નિર્મીલ પાત્રે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



→ તૃતીયક પુટીકા પુષ્કલ પુટીકા અને ગ્રાફિયન પુટીકામાં રૂપાંતર થાય છે.

→ ફોલિક્યુલ પુર્વ અંડકીય તેની ફરતે નવા સ્તરની રચના ધરાવે છે તેને = ઝોના પેલ્યુસીડા
Zona pellucida

→ હવે ગ્રાફિયન પુટીકાના સુરવાથી અંડચંદ્રમાંથી ફોલિક્યુલ પુર્વ અંડકીય (ન) મુક્ત થાય છે.



આ પ્રક્રિયાને અંડકીયપાત (ovulation) કહે છે.




મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



અંડપુટીકાઓનો વિકાસ



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR




ઋતુચક્ર (Menstrual Cycle)

→ ગાદા પ્રાર્થનક (ઉદા = માનવ, ચીંચસ, વાંદરા) માં
જીવા મળતા ગર્ભાશયના સ્ત્રીય ફેરફારો જે
28-29 દિવસના હોય છે. = ઋતુચક્ર

- **રમેન્ટ્રીશન** = યૌવનારંભે પ્રથમ ઋતુચક્રાવળી
Menarche શરૂઆત (આશરે 10 થી 13 વર્ષ)
- **રમેનપૌસિ** = માનવમાં ઋતુચક્ર 50 વર્ષની ઉંમર
Menopause આસપાસ હાથ પાવ લેને...

⇒ આમ ઋતુચક્ર એ રમેન્ટ્રીશન અને રમેનપૌસિ વચ્ચે લંબાયેલ જીવા મળે છે.



Schematic representation of menstrual cycle

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

(i) સ્રવસ્ત્રાવ તબક્કો (Menstrual phase) (૧ થી ૬ દિવસ)

- રૂઢિરમાં બદા જ માદા મલીય અંતઃસ્ત્રાવીનુ પ્રમાણ ઘટી જવાથી અંડોમેદ્રિયમ વિઘટન પામે.
- રૂઢિરવાહિનીઓ લુટે છે. લીના લીધે નિર્મોળ પાત્રુ પ્રવાહી યોનિમાર્ગે મારકત બહાર ઢકેલાય.
- તે દરમ્યાન ૬૦ થી ૧૬૦ મ્મ રૂઢિર વ્યય પામે છે.



સ્રવસ્ત્રાવ તબક્કો (૭ થી ૬ દિવસ બાલે)

- સ્રવસ્ત્રાવ તબક્કો ત્યારે જ મિવા મળે જ્યારે અંડકોષ ફલિત દોતી નથી.
- સ્રવસ્ત્રાવનો અભાવ ગર્ભદારણ સુચવે છે.
- મેકે લગાવ, અવ્યવસ્થા જેવા કસલોધા પણ સ્રવસ્ત્રાવ અનિયમિત/અભાવ ચઈ શકે છે.

(ii) પુટકીય તબક્કો / પોલીફરેટિવ તબક્કો / પુનઃનિર્માણ તબક્કો = (૬ થી ૧૩ દિવસ)
Follicular phase / Proliferative phase / Regenerative phase

- આ તબક્કામાં અંડકોષમાંથી પ્રાથમિક પુટિકાઓ વૃદ્ધિ પાતી પુર્ણ વિકસિત ગ્રાફિયન પુટિકામાં ફેરવાય છે.
- ગર્ભાશયનુ અંતઃસ્ત્રાવ અંડોમેદ્રિયમ પુનઃમર્જિત થાય.
- આ લંને રૂઢિઓ પરિચુરતી અને અંડકોષીય અંતઃસ્ત્રાવીના પ્રમાણમાં ઘટા ફેરફારો વડે થાય છે.
- LH અને FSH નો સ્રાવ આ તબક્કામાં ફરફા: વધે છે.
- વિકસિત પુટિકાઓ ઇસ્ફોજનના સ્રાવને પ્રેરે છે.



અંડોમેદ્રિયમ મકુ, રૂઢિરવાહિનીયુક્ત અને ગ્રંથિમય બને છે.



(iii) અંડપાત તબક્કો / અંડક્રીયપાત તબક્કો = (14 માં દિવસ)
Ovulatory phase

- આશરે 14 માં દિવસે LH & FSH બંનેનું પ્રમાણ ઉચ્ચ સ્તરે પ્રાપ્ત કરે છે.
- LH નો ઝડપી સ્ત્રાવ તેને ચક્ષુના મધ્યાક્ષ્ણ સમય દરમ્યાન દોરી મળે છે.



LH પરાક્ષણ (LH Surge)

- તેના લીધે ગ્રાફિયન પુરુષ છાટે છે. પરિણામે અંડક્રીય મુક્ત થાય છે. તેને અંડક્રીયપાત કહે છે.
- Ovulatory phase

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

(iv) સ્ત્રાવી તબક્કો / લ્યુટીયલ તબક્કો = (15 થી 28 દિવસ)

- વિઘટિત ગ્રાફિયન પુરુષ ક્રીપર્સ લ્યુટીયમમાં ફેરવાય છે.
- ક્રીપર્સ લ્યુટીયમમાંથી પ્રોજેક્ટેશન નો સ્ત્રાવ થાય છે.



તે ગર્ભના અંતઃસ્તરની મળવણી માટે આવશ્યક છે.

- ઓન્ડોમેટ્રિયલ એ ફલિત અંડક્રીયના સ્થાપન અને ગર્ભદાશનની દ્વિયા માટે જરૂરી છે.
- ગર્ભદાશ દરમ્યાન પ્રસુત્યકની બધી જ ઘટના અટકી મળે છે અને પ્રસુત્રાવ થતો નથી.
- જો ફલન ન થાય તો ક્રીપર્સ લ્યુટીયલ વિઘટિત થાય છે. જેના લીધે ઓન્ડોમેટ્રિયલ વિઘટન પામે છે.




પ્રસુત્રાવ થાય (નવા પ્રસુત્યકની શરૂઆત થાય)

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR






મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR

માસિક ચક્રના તબક્કાઓ



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



ફલન – Fertilization

→ સંવનન / મેયુનફિકેશન (Coitus) દરમિયાન નર શિશન દ્વારા માદાના યોનિમાર્ગમાં વીર્ય ઠાલવે છે.



→ આ વીર્યનો જથ્થો 3 થી 4 મી છે. જેમાં અલગજો શુક્રકીર્તીઓ આવેલા હોય છે.

→ હવે આ શુક્રકીર્તીઓ ઝડપથી તરે છે & સ્ત્રીના ડારા ગર્ભાશયમાં પ્રવેશ કરે છે.



અંડવાહિનીના લુંલિકા-ઇસ્થમસ ખેડાણ સ્થાન તરફ પહોંચે છે.

→ ત્યાં અંડપિંડ દ્વારા મુક્ત થયેલી કિલિવક પુરું અંડકીર્તી દર્શાવે છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR




❖ ફલન ત્યારે જ શક્ય બને છે જ્યારે શુક્ષ્મકી અને ઓંડકી બંને વહન પામી લુંબકીય - ઇથમસ ઝીડાણ સ્થાને પહોંચે.

❖ આ જ કારણથી બધી જ સંવનન ક્રિયાઓ ફલન અને ગર્ભદાશણમાં પરિણમતી નથી.

❖ શુક્ષ્મકીના ઓંડકી સ્થાનેના ઝીડાણની ક્રિયાને ફલન કહે છે.
તે 5 થી 6 કલાક સમય લે છે.



❖ પ્રિલિયક પુર્વ ઓંડકી (n) અસંખ્ય શુક્ષ્મકી વડે ઘેરાય છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

→ ફલન દરમિયાન શુક્ષ્મકી ઓંડકીના ઝીના પેલ્યુટરીડા ના સંપર્કમાં આવે છે.


→ શુક્ષ્મકીના શુક્રગ્રામાંથી ઇયલ્યુરીનિડે ઉત્સર્જકનો સ્ત્રાવ થાય છે. જે શુક્ષ્મકીને પ્રિલિયક પુર્વ ઓંડકીમાં પ્રવેશ શક્ય બનાવે છે.



તે ઝીના પેલ્યુટરીડા અને કીચક્ષપટલ મારફતે ઓંડકીમાં પ્રવેશ કરે છે.

→ શુક્ષ્મકીના શાર્પ અને મધ્યભાગ પ્રિલિયક પુર્વ ઓંડકીમાં પ્રવેશ કરે છે.

→ હવે, શુક્ષ્મકીના શાર્પમાં રહેલા ક્રીસકેન્ડ્રે → નર પ્રક્રીયકેન્ડ્રે (n) વસીકે ઓળખાય.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

→ શુક્રક્રિમનો પ્રવેશ ઢિલિયક પુર્વે ંડક્રિમ (ન) લાક્કલીક ફેરફારને પેરે છે અને અન્ય શુક્રક્રિમના પ્રવેશને અટકાવે છે.

→ તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે ફક્ત એક જ શુક્રક્રિમ એક જ ંડક્રિમમાં પ્રવેશ કરે અને કલિત થાય.

→ શુક્રક્રિમના પ્રવેશ બાદ તરત જ ઢિલિયક પુર્વે ંડક્રિમ (ન) પરિપક્વન પામી પરિપક્વન ંડક્રિમ (ન) મા ફેરવાય છે. તેના ક્રિષકેન્દ્રને = માદા પ્રક્રિષકેન્દ્ર (ન)


→ હવે નરપ્રક્રિષકેન્દ્ર (ન) અને માદા પ્રક્રિષકેન્દ્ર (ન) ના સંમિલન થી ઢિલિય (2n) યુગ્મનજ બને છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



MP SIR Power Notes for NEET



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR

→ ફિલિપ આંડરસનને ફલિપાંડ (2મ) કહે છે.

→ ફલિતાંડ જ્યારે અંડપાહિનીના ઉચ્ચમઝ ધ્રારા ગર્ભાશય તરફ વહન પામે ત્યારે તેમાં એમ્બ્રિયોના જિયા શરૂ થાય છે = પિઅંડન કહે.

cleavage / cellulation / segmentation

→ પિખંડન = "વોન બેર" દ્વારા જાણવામાં આવ્યા.



→ વિખંડનની પ્રક્રિયાના કારણે અવકેષીય યુગ્મનજ જે કૃત્રિક ભાગમુગ્રીભાગનના લીધે ફેરફાર પામી જરિલ બહુકેષીય ભાગનાનુ નિર્માણ કરે છે.

પિંચડળના કારણે બનેલા કીચડી = હાલ્કાટીયર્સ

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

→ તેમાં 2, 4, 8, 16 બાળકોનું નિર્માણ થાય છે જેને ગર્લેકેડી ખંડ કહે છે.
ગર્લેકેડી ક્રીપો

→ વિખંડનનું અહત્ય = ગેરકુલા તબક્કાના સ્થંત સુધીમાં વિકસતા જુલના સ્વાકાર સ્થન કદમાં ક્રીઈ ક્રેકાર થતી નથી. તે સ્થવસ્થા સુધી તે સ્થવિલાશ્રુત સ્થંડકીષ્ત જેવો જ સ્વાકાર દારાલે છે.

→ વિખંડનના પરિણામે ઓક્સિજનીય યુગ્મનજ એ બહુકિર્ણીય રચનામાં ફેરવાય છે.

→ મોરલા = (Morula) = વિષંડનની પ્રક્રિયાને કારણે એકકીયીય યુગ્મનજ એ સાચત દડા જેવી બહુકીયીય રચનામાં ફેરવાય છે. = મોરલા અવસ્થા

→ જેમ જેમ યુગ્મજ સંડવાઈનીના દ્વિયમમથી ગર્ભાશય તરફ વહન પામે તેમ સમસ્ત્રીભાજન થાય છે. ⇒ હાઈડ્રોમીયર્સ

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

❖ 8 થી 16 ક્રીમીય લ્હાસ્ટોમર ધરાવતો ગર્ભ = મોડુલા

↳ આવી વિજન થતા 1 થી 3 દિવસ લાગે છે.

❖ દિવસ 4 અને 5 = "ગર્ભક્રીષ્ઠ ક્રીયળીનુ" નિર્માણ.

→ મોડુલા સતત વિભાજન પામે છે & ગર્ભાશય તરફ ઝાગળ વધે છે → ગર્ભક્રીષ્ઠક્રીયળી
Blastocyst


→ ગર્ભક્રીષ્ઠ ક્રીયળીના બહારના સ્તરમા ગોઠવાયેલા ક્રીમીને = પોષકક્રીમી કહે છે.



તેના સ્તરને ગર્ભપોષક સ્તર કહે છે.

→ પોષકક્રીમી સાથે જોડાયેલા અંદરના ક્રીમીના સમૂહને = અંતઃક્રીમ સમૂહ.

→ ગર્ભક્રીષ્ઠ ક્રીયળીમાં આવેલા પ્રવાહીનુ નિર્માણ ગર્ભપોષક સ્તરના ક્રીમી દ્વારા થાય છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

❖ દિવસ 6 અને 7 (ગર્ભસ્થાપન) =

→ હવે ગર્ભાશયની અંદરની દિવાલમાં ગર્ભસ્થાપનની પ્રક્રિયા થાય છે.

→ ગર્ભની ફરતે આવેલું જેલી જેવું પદ દુર થાય છે.

→ ગર્ભપોષક સ્તરના ક્રીમીમાંથી ઉત્ક્રિયક્રીમો સ્ત્રાવ થાય છે.



જે ગર્ભાશયની દિવાલમાંની કિટલીક પેશીઓ & રુધિરવાહિનીઓ પચાવે છે.


→ હવે પોષકસ્તર ગર્ભાશયના અંતઃસ્તર (એન્ડોમેટ્રીયમ) સાથે જોડાય છે.

→ ગર્ભાશયની દિવાલની ખાંચ અને ગર્ભક્રીષ્ઠ ક્રીયળીને ઘેરે છે. જેને ગર્ભસ્થાપન કહે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)


MAULIK PANCHAL SIR





મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



- ગર્ભસ્થાપન પછી ગર્ભાશયની દિવાલને ઓન્ડોમેટ્રિયમને બદલે = ડેમિડુઆ
- ડેમિડુઆનો ભાગ કે જ્યાં જરાયુ બને તેને ડેમિડુઆબેસાલીમ્ કહે છે.

- ગર્ભાશયના પીલાણથી લુપને અલગ કરતા ભાગને ડેમિડુઆ કિન્ગુલારીમ્ કહેવાય છે.
- ગર્ભાશયના પીલાણના વધેલા ભાગને ડેમિડુઆ પેરીએટાલિમ્ કહેવાય છે.

⇒ ઈન્ટરસ્ટીશીયલ ગર્ભસ્થાપન = હોસ્ટોમિક્ટ ગર્ભાશયની દિવાલમાં ઊંડાણપૂર્વક આવરિત થાય છે. અને અધિવૃદ્ધિથી અત્યંત અન્ડોમેટ્રિયલ પેશીથી આવરિત થાય છે.
(આ પ્રકારનું ગર્ભસ્થાપન મનુષ્યમાં મેળા મળે છે)

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

- ગર્ભસ્થાપનની ગ્રંથિમાં ક્રીપર્સ લ્યુટીયમ તેના નિર્મોહના 14 દિવસ પછી વિદ્યમાન પામે.
- ↓
- ક્રીપર્સ આલ્ગીકન્સ

* ક્રીપર્સ લ્યુટીયમનું કાર્ય =

- LH નું વધતું પ્રમાણ ક્રીપર્સ લ્યુટીયમનો પ્રોજેક્ટરોનનો સ્ત્રાવ કરવા પ્રેરે છે.
- પ્રોજેક્ટરોન ઓન્ડોમેટ્રિયમને ગર્ભસ્થાપન માટે પ્રેરે છે.
- જો ગર્ભસ્થાપન થાય તો ક્રીપર્સ લ્યુટીયમમાંથી પ્રોજેક્ટરોનનો સ્ત્રાવ થાય છે.
- ગર્ભાવસ્થાને મળવા પ્રોજેક્ટરોન અગત્યનો છે.
(તેને પ્રસૂતિનો સંતાનસ્ત્રાવ / Pregnancy Hormone કહે છે)

- પ્રસૂતિના ચાર મહિના પછી જરાયુ સંપૂર્ણપણે વિકસ પામે છે આ જરાયુ પ્રોજેક્ટરોનના સ્ત્રાવનું કાર્ય કરે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



→ ઝાંડપતન બાદ ગર્ભસ્થાપન ન થાય તો પ્રોજેક્ટરોનનું પ્રમાણ વધે.

→ તેનું વધતું પ્રમાણ GMRH ના સ્ત્રાવને સ્વલ્પે છે.



તેના લીધે LH & FSH સ્ત્રાવ બંધ થાય અને ક્રીપર્સ લ્યુટીયમમાંથી પ્રોજેક્ટરોનનો સ્ત્રાવ ઘટે છે.

(ક્રીપર્સ લ્યુટીયમ → ક્રીપર્સ આલ્લીકન્સ)

→ અંકરોપિક ગર્ભાવસ્થા = ગર્ભાશય સિવાયના કોઈ પણ સ્થાને ગર્ભનું સ્થાપન થાય તો તેને....

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



ગર્ભધારણ અને ગર્ભવિકાસ

→ માદા પ્રજનનતંત્રમાં શિશુના વિકાસના સમયનું = ગર્ભધારણ

→ મનુષ્યમાં ગર્ભધારણનો સમય આશરે ઝાંડપતન પછીના 266 દિવસો (40 અઠવાડિયા) હોય છે.
હોલ્સા ગણતરીના પછીના 280 દિવસો 9 મહિના

→ પ્રથમ 12 અઠવાડિયા દરમિયાન ફલિત ઝાંડકીયના વિકાસને = ગર્ભ (Embryo)



ત્યારબાદ વિકાસને = ભ્રુણ (foetus)

→ ગર્ભસ્થાપન બાદ ગર્ભપોષક સ્ત્રાવમાંથી આંગળી જેવા પ્રવર્ધ દેખાય = જરાયુષ અંકુર



ગર્ભાશયની પેશીઓ અને માતાના રક્તો દ્વારા દેરાયેલા હોય છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



જરાયુજ અંકુર અને ગર્ભાશય પેશી એકલીમ સાથે સંકળાઈ જરાયુ(Placenta) નું નિર્માણ કરે છે.

↓
ભ્રુણ & માતાના શરીર વચ્ચે રચનાત્મક & ક્રિયાત્મક એકમ છે.

જરાયુ દ્વારા ભ્રુણને ઓક્સિજન અને પોષકતત્વો પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે ભ્રુણના CO_2 અને ઉત્સર્ગ (બકત્રા) ફેળવેને દુર કરે છે.

જરાયુ ભ્રુણ સાથે ગર્ભનાભ (Umbilical cord) દ્વારા સંકળાય છે. જે ભ્રુણની અંદર અને બહાર પદાર્થોના વહનમાં મદદ કરે છે.

જરાયુ ઔતઃસ્ત્રાવી પેશી તરીકે વર્તે છે & ઘણા અંતઃસ્ત્રાવો નો સ્રાવ કરે જેમ કે,
HCG = દુગ્ધન ક્રિયાનિત્ર ગોનાડોટ્રોપિન
HPL = દુગ્ધન પ્લેસેન્ટલ લેક્ટોજન
ઈસ્ટ્રોજન & પ્રોજેસ્ટેરોન વગેરે ---


મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

ગર્ભાવસ્થાના અંતભાગે અંડપિંડમાંથી = રિલેકિસન નો સ્રાવ થાય.

NEET = સ્ત્રીમાં HCG, HPL અને રિલેકિસન ફક્ત ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન જ ઉત્પન્ન થાય છે.

વધારામાં ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન માતાના રુધિરમાં અન્ય અંતઃસ્ત્રાવો જેવા કે ઈસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટેરોન, પ્રોલેક્ટીન & થાયરોક્સિન નું સ્તર ઘણી વધુ મળે છે. આ અંતઃસ્ત્રાવોનો વધારો ગર્ભની વૃદ્ધિના આધાર માટે માતામાં વ્યયાયયતીક ફેરફારો & ગર્ભાવસ્થાની મળવાની માટે આવશ્યક છે.



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

જરાયુ (Placenta)

- ગર્ભસ્થાપન થવાની સાથે જરાયુના નિર્માણની શરૂઆત થાય છે.
- જરાયુની રચનામાં ગર્ભપોષક લેમ્બ ઉપનાળ જન લાગ લે છે. આવા જરાયુને ગર્ભપોષક ઉપનાળ જરાયુ કહે છે.
- જરાયુમાં ગર્ભપોષક રક્તકુશો માતૃપેશીમાં લંબાય છે.
- ધ્વસ્ત્રા સ્પષ્ટાદ સુધીના વિકસ સમયે જરાયુનો વિકસ પુર્ણ થઈ ગયો હોય છે.
- જરાયુની એક બાજુ માતાના ગર્ભાશયની પેશી હોય છે. બીજી બાજુ જુજાની ગર્ભપોષક ઉપનાળ પેશીઓ હોય છે.

→ ગર્ભપોષક રક્તકુશો માતૃપેશીના રૂધિર કિરણોના ઇલાચેલા હોય છે. આવા જરાયુ જેને ---
↓
રૂધિર - ગર્ભપોષક જરાયુ કહે.

→ જુજાનુ રૂધિર અને બાળકનુ રૂધિર એકમેકમાં લગતુ નથી.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

- જરાયુ દ્વારા જુજા માતાના શરીરમાંથી પોષકદ્રવ્યો, O_2 , એનિઝાઈડ મેળવે છે.
- જ્યારે જુજામાંથી ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો કે CO_2 માતાના શરીરમાં ગય છે.


- આવા દ્રવ્યોની આપ-લે ઉપનાળ દ્વારા થતી હોવાથી ઉપનાળને જુજાની "ખુલાદોરી" કહે છે.
- પ્રથમ બે માસના વિકસને = ગર્ભવિકસ
ત્યારબાદ બે વિકસ (ત્રણથી નવ માસ) = જુજાવિકસ

→ ગર્ભવિકસ અને જુજાવિકસ પુરો થતા લગભગ 2૪૦ દિવસનો સમય લાગે છે.

- અવલ્ય પ્રસવી પ્રાણીઓમાં જરાયુ મેવા મળે છે.
(જરાયુએ હંગાની અંતઃ સ્ત્રાવી લંઘાચલ છે. જે આંશિકરૂપે માતૃપેશી અને ગર્ભાશય પેશીમાંથી ઉદ્ભવે છે.)

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



ભ્રુણીય વિકાસની સામાન્ય અવસ્થાઓ

MP SIR Power Notes for NEET

- મોઝુલા અવસ્થા = વિષંડનની પ્રથિયાના પરિભ્રમણ અક્ષીકીય (2n) યુગ્મનજ થી 2, 4, 8, 16 લાલક્રીંષી બિભીલ પામે છે. જેને ગ્લાસ્ટોમીયર કહે છે.
→ મોઝુલા ગુર્ભ = 8 થી 16 કીંષી અવસ્થા.
- ગ્લાસ્ટુલેશન = ગર્ભકીંષુ કીંષી (ગ્લાસ્ટોકીસ્ટ) ના ગ્લાસ્ટોમીયર બધર વરક્ષના આવરણમાં ગોઠવાયેલા હોય જેને ટ્રીફોલેસ્ટ (ખોચક કીંષી) કહે છે.
- ગેસ્ટુલેશન = ગેસ્ટુલા અવસ્થામાં વિષંડનના વિભાજનનો દર ઘટી જાય છે.
આંત્રકીંષન
→ જીવનીય વિકાસમાં ગેસ્ટુલા અવસ્થા સૌથી મહત્વની અવસ્થા છે.
કાંકે આ અવસ્થામાં ગ્લાસ્ટોમીયરનું વિભેદન થાય છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

- હાસ્ટોમરના લિન્નતાના કચલો ત્રણગર્ભસ્તર (બાહ્યસ્તર, મધ્યસ્તર અને અંતઃસ્તર) બને છે.
- ગેસ્ટ્યુલેશન પછી જુલમાં અંગજનનની શરૂઆત થાય છે.
- શરૂઆતમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઊર્જાની જરૂર પડે છે જેની અંડકીચની ચક્ષનદિયા વધે છે. (આ અવસ્થામાં જીજ્ઞા સોધી વધુ ઓક્સિજન મેદળ કરે છે)

*** ગેસ્ટ્યુલેશન પદ્ધતિ =**

૧) આદ્યપ્રોપા (Epiboly)

- બાહ્યગર્ભસ્તર બનાવતા હાસ્ટોમીયરની ગતિ.

૨) અંતરાશિદ્ધ (Emboly)


- મધ્યગર્ભસ્તર અને અંતઃગર્ભસ્તર બનાવતા હાસ્ટોમીયરની ગતિ.

- ગર્ભસ્થાપન બાદ તરત જ અંતઃક્રીષ સમુદ્ધ બાહ્યગર્ભસ્તર, મધ્યગર્ભસ્તર, અંતઃગર્ભસ્તરમાં વિભેદિત થાય છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

- **સ્ટેમ ક્રીષ** = અંતઃક્રીષ સમુદ્ધ, સ્ટેમ ક્રીષો તરીકે ઓળખાતા કેટલાક ક્રીષો દ્વારા છે. જે બધી જ પેશીઓ અને અંગોનું નિર્માણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.




મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



Ectoderm (બાહ્ય ગર્ભસ્તર)



ત્વચાના અધિચ્છદીય કોષો



ચેતાકોષ




રંજકદ્રવ્ય


Endoderm (અંતઃગર્ભસ્તર)



વાયુકોષના કોષો




થાયરોઇડના કોષો




પાયનતંત્રના કોષો


Mesoderm (મધ્ય ગર્ભસ્તર)




હૃદસ્નાયુ




સ્નાયુકોષો



મુત્રપિંડના કોષો



રક્તકણો



લીસા સ્નાયુ

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



બાહ્ય ભ્રુણીય કલાઓ

→ ગ્લાસ્ટ્રોમીયરનું ક્રીવીય આપરણ ગ્લાસ્ટ્રોડર્મ તરીકે ઓળખાય છે.


→ ગ્લાસ્ટ્રોડર્મનો મધ્ય ભાગ ભ્રુણમાં વિકસે ત્યારે પરિધવર્તી ભાગ ભ્રુણના મિત્રોલમાં ક્રીઈ ભાગ લેતી નથી.




પરિધવર્તી ભાગ = બાહ્ય ભ્રુણીય કલાઓ.

Extra Embryonic membrane

→ ની ભ્રુણને રક્ષણ & પોષણ પુરૂ પાડે છે.



મનુષ્યમાં બાહ્યગર્ભીય આવરણોનું નિર્માણ



Chick

Human

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



→ તેમાં ચાર બાદ્ય જુગીય ક્લાસો આવેલી હોય છે.

i) ઉલ્લસીયળી ii) જુલપોષક iii) ઉપનાળ iv) જરદી કીયળી

i) ઉલ્લસીયળી (Amnion)

→ 14 દિવસના ગર્ભવિકાસ સમયે ઉલ્લસીયળી વિકાસ પામે છે.

→ ઉલ્લસીયળીએ ગર્ભકીષ્ક પાર્શ્વના ભાગમાંથી વિકસે છે.

→ તે વિકાસ પામીને ગર્ભને & જુલને સંપૂર્ણપણે ઘેરી લે છે.

→ ઉલ્લસીયળીમાં ઉલ્લપ્રવાહી (Amniotic fluid) આવેલું છે. જે જુલને લાપમાનના ફેરફારથી સુરક્ષિત રાખે છે.

ii) જરદી કીયળી (Yolk Sac) =

→ 21 દિવસના ગર્ભવિકાસ સમયે જરદીકીયળી વિકાસ પામે છે.

→ મનુષ્યમાં જરદી કીયળી નામ પુરલી કર્યાદિત છે.

→ ગર્ભને પોષણ માતાના શરીરમાંથી મળતું હોવાથી જરદી કીયળીનું કોઈ મહત્વ નથી.

→ તે મધ્યગર્ભસ્તર અને અંતઃગર્ભસ્તરમાંથી બને છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

iii) ઉપનાળ (Allantois) =

→ તે જુગીય મધ્યગર્ભસ્તરમાંથી બને છે.

→ 21 દિવસના ગર્ભવિકાસ સમયે ઉપનાળનો વિકાસ થાય છે.

→ તે જુલપોષક જરાયુની રચનામાં ભાગ લે છે.

→ તે રૂઢિરક્તશિક્ષા યુક્ત & નલિકાકાર રચના છે. તેમાંથી ભવિષ્યમાં ગર્ભનાળ બને છે. જે જુલને જરાયુ સાથે ઝેડે છે.

→ જુલને ધસન અને પોષણના પુરવઠાનું ધ્યાન રાખે છે.

iv) જુલપોષક (Chorion) =

→ ગર્ભપોષક સ્તર અને મધ્યસ્તરનું પડ સાથે મળીને જુલપોષકની રચના કરે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



→ ગર્ભાવસ્થાના અંતે ગર્ભાશયમાં શક્તિશાળી સંકેચન પ્રેરાય છે. જેના કારણે ગર્ભનો બહાર નિકાલ/પ્રસવ થાય છે.

ગર્ભના પ્રસવની આ દિવાને = બાળજન્મ / પ્રસૂતિ કહેવાય.

→ પ્રસૂતિ એ એકા અંતઃસ્થાવી દિવા કારા પ્રેરાય છે.

→ પ્રસૂતિ માટેના સંકેતો સંપૂર્ણ વિકસિત ગર્ભ & જરાયુ માંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જે ગર્ભાશયના દબા સંકેચનને પ્રેરે છે.

ગર્ભના નિકાલની પરાવર્તી દિવા.

→ આ દિવા માતાની પિરયુટરી ગ્રંથિમાંથી ઓકિસટોક્ષીન સ્ત્રાવન પ્રેરે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

→ ઓકિસટોક્ષીન ગર્ભાશયના સ્નાયુ પર અસર કરે છે. જેના લીધે ગર્ભાશયનું શક્તિશાળી દલનચલન થાય છે.

→ આ સંકેચન બાળકને પ્રસવ માર્ગ દ્વારા ગર્ભાશયમાંથી બહાર નિકાલ તરફ દીરી મથ. (જરાયુમાંથી પ્રોસ્ટાગ્લેડીન્સનો સ્ત્રાવ થાય)

→ સ્ત્રીની સ્તનગ્રંથિ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન વિકસિત થાય છે & ગર્ભાવસ્થાના અંતે તરફ જતા દુધસ્ત્રાવ થાય છે.

→ આ દિવા નવા જન્મેલા બાળકને અરોક્ષ આપવામાં મદદ કરે છે.

→ દુધસ્ત્રાવના શરૂઆતના દિવસો દરમિયાન દુધ ઉત્પાદનને કોલોસ્ટ્રમ (નવ સ્તન્ય દુધ) કહે છે. તે નવા જન્મેલા બાળકમાં પ્રતિકરક્તા પિક્ષાય છે.

↓
IgA અંતરબોડી

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



• મનુષ્યના એક મહિનાની ગર્ભાવસ્થા :

→ હૃદયનું નિર્માણ થાય છે.

→ વિકસતા જીવનનું પ્રથમ લક્ષણ સ્ટેથોકોર્ડ વડે હૃદયનો અવાજ સાંભળીને થાય છે.

• બીજા મહિના :

→ બીજા મહિનાની ગર્ભાવસ્થાને અંતે જીવનના ઉપાંગો અને આંગળીઓનો વિકાસ થાય છે.

• 12 અઠવાડિયાના અંતે :

→ 12 અઠવાડિયાના અંતે (પ્રથમ ટ્રાયમેસ્ટર) લગભગ બધા અંગાંત્રો નિર્માણ પામે છે.

ઉપાંગો અને બાહ્ય જનનાંગો સુવિકસિત થાય છે.

• પાંચમો મહિનો :

→ જીવનનું પ્રથમ હલનચલન અને શીર્ષ પર વાળની હાજરી સામાન્ય રીતે પાંચમા મહિનામાં થવા મળે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

• 24 અઠવાડિયાના અંતે :

→ લગભગ 24 અઠવાડિયાના અંતે (ત્રિતીય ટ્રાયમેસ્ટર), શરીર પર સુક્રમ વાળનું આવરણ, આવરણ પીપથા અલગ પડે છે. (પાંપણ બને છે)

• નવ મહિનાને અંતે :

→ ગર્ભાવસ્થાના 9 મહિનાના અંતે સંપૂર્ણ વિકસી પામી પ્રસૂતિ માટે તૈયાર થાય છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



પ્રથમ અઠવાડિયું	- ફલિતાંડમાં વિખંડન થાય. - ગર્ભકોષ કોથળીનું ગર્ભમાં સ્થાપન. - માતામાંથી પોષણ મેળવવાની શરૂઆત.
બીજું અઠવાડિયું	- ગર્ભકોષ કોથળીનું ગર્ભમાં સ્થાપન. - એન્ડોમેટ્રિયમમાં ઊંડો ઊતરે. - ગર્ભીય તકતી અને ઉલ્લ કોથળીનો વિકાસ. - મધ્ય ગર્ભસ્તર, બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતઃ ગર્ભસ્તર વચ્ચે ફેલાય.
ત્રીજું અઠવાડિયું	- ગર્ભીય તકતી પહોળી થાય. - આદિ હૃદય નિર્માણ પામે છે. - હજુ હૃદય ધબકતું નથી.
ચોથું અઠવાડિયું	- ઉલ્લ પ્રવાહીમાં ગર્ભ રક્ષણ પામે છે અને મુક્ત થાય છે. - પ્રાથમિક મગજ, આંખો, જઠર, મૂત્રપિંડ અને હૃદયનો વિકાસ. - હૃદય ધબકવાનું શરૂ કરે છે, તે આશરે 1 મિનિટમાં 60 વખત ધબકે - આદિ ગર્ભનાળનો વિકાસ. - આ તબક્કામાં ગર્ભ 4 સેમી કરતાં ઓછી લંબાઈ ધરાવે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

બીજો મહિનો	- ગર્ભ મનુષ્ય જેવો દેખાય છે. - શરીરના મુખ્ય અંગો વિકસે છે અને તેમના કાર્યો શરૂ કરે છે. - આ તબક્કામાં શરીરની સાપેક્ષમાં શીર્ષ મોટું હોય છે. - તે 2.5 સેમી લાંબુ હોય છે.
ત્રીજો મહિનો	- હવે ગર્ભને ભૂણ કહે છે, એટલે કે 'તરુણ' (Young one). - ભૂણ 7.5 સેમી ઊંચાઈ અને 14 ગ્રામ વજન પ્રાપ્ત કરે છે. - શરીર વૃદ્ધિ પામે છે, પરંતુ શીર્ષ મોટું જ રહે છે. - ઉપાંગો લાંબા બને છે. - બાહ્ય જનનાંગો દેખાય છે, પરંતુ જાતિ ઓળખવી અઘરી હોય છે. - ઉપાંગો અને શરીરનું સામાન્ય હલનચલન થાય છે.
ચોથો મહિનો	- શરીર ચળકતા લાલ રંગનું દેખાય છે, કારણ કે રુધિરવાહિનીઓ પારદર્શક ત્વચાની આરપાર વૃદ્ધિ પામે છે. - સ્નાયુઓ સક્રિય બને છે.
પાંચમો મહિનો	- ત્વચા ઓછી પારદર્શક બને છે અને વાળ દ્વારા ઘેરાય છે. - ગર્ભધારણના આ તબક્કા બાદ જરાયુની વૃદ્ધિ ધીમી પડે છે.
છઠ્ઠો મહિનો	- ચરબીના અભાવે ત્વચા કરચલીમય બને છે. - તેના પોપચાં જુદા પડે છે, પણ કીકી પડ દ્વારા આવરિત હોય છે. - ભૂણ આશરે 32 સેમીનું માપ અને 650 ગ્રામ વજન ધરાવે છે.
સાતમો મહિનો	- ભૂણ ગર્ભાશયમાં શક્તિશાળી રીતે ગોળ ફરે છે. - તે તેની આંખો ખોલે છે. - જો આ તબક્કામાં બાળક જન્મે તો તે મુશ્કેલી સાથે શ્વાસ લે છે.

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR



આઠમો મહિનો


- ⇒ આ તબક્કામાં બ્રૂણ આશરે 42 સેમી લાંબુ અને 1800 ગ્રામ વજન ધરાવે છે.
- ⇒ ફેફસાં વિકાસ પામે અને તે જીવને આધાર આપે છે.
- ⇒ જો આ તબક્કે બાળક જન્મે તો નિષ્ણાતની સલાહ મુજબ તેની જાળવણી કરવી આવશ્યક છે.

નવમો મહિનો

- ⇒ આ મહિનાના અંતે બ્રૂણનું કદ આશરે 46 સેમી હોય છે.

દસમો મહિનો

- ⇒ આ તબક્કામાં માતા તેના બાળકના જન્મની રાહ જુએ છે.
- ⇒ સામાન્ય રીતે બાળક આશરે 50 સેમી લાંબુ અને 3300 ગ્રામ વજન ધરાવે છે.
- ⇒ બાળકના જન્મ સમયના વજનમાં ઘણું વૈવિધ્ય જોવા મળે છે.



1 trimester

2 trimester


3 trimester

TRIMESTER	MONTHS	WEEKS
1 st	1	0 - 4
	2	5 - 8
	3	9 - 13
2 nd	4	14 - 17
	5	18 - 22
	6	23 - 27
3 rd	7	28 - 31
	8	32 - 35
	9	36 - 40

મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR

✓ બાળકનો નવ મહિનાનો ગર્ભવિકાસ



મનુષ્યમાં પ્રજનન (Human Reproduction)

MAULIK PANCHAL SIR